Med de nævnte trykte
4 sider Tillæg

185-

mm

1/2

ci/9-

A. Wetmore

M. TH. BRÜNNICHII
ORNITHOLOGIA
BOREALIS,

Sistens

COLLECTIONEM AVIUM

EX OMNIBUS, IMPERIO DANICO SUBJECTIS,
PROVINCIIS INSULISQUE BOREALIBUS

HAFNIÆ FACTAM,

Cum

DESCRIPTIONIBUS NOVARUM,

NOMINIBUS INCOLARUM,

LOCIS NATALIUM

ET

ICONE.

IMPRIMATUR, J. C. KALL.

HAFNIÆ, MDCCLXIV.

Q.L.
690
D3
B58
1764
Copy 2
SCHURB

VIRO

PER-ILLUSTRI ET AMPLISSIMO

DOMINO

CHRISTIANO
DE FLEISCHER,

S. R. M.

CONSILIARIO STATUS,

MEMBRO.

COLLEGII REGII ADMIRALITATIS

ET

GENERALIS COMMISSARIATUS

&c. &c.

Ornithologiam banc, TE collectore,
ortam, TE autore, susceptam,
TE annuente, editam, TIBI, studio-
rum, quibus delector, fautori & pro-
motori, sacram volui,

TANTI NOMINIS

Cultor devotissimus

M. TH. BRÜNNICHIUS.

LECTORI.

Multas Scandinaviam alere aves, olim aliis orbis terrarum regionibus tanquam proprias spectatas, nonnullas alibi plane ignotas, suecica testatur Fauna, omnium avium, *Carolo de Linné*, equiti, in patria notarum continens descriptiones; plures postea septentrioni tribuit *Briffonius*; Daniain autem & Norvegiam cum subjacentibus insulis borealibus, quales sunt Feröenses, Islandia & Grönlandia, avium septentrionalium numerum insigniter augere probat per-illustris possessoris, avibus tantum borealibus ornatum, museum.

Monstrantur ibi aves inter rariores: Falcones Islandici cum novo, lagopus dicto; corvus varius Feröensis: anates Islandicæ, hæcenus tantum ex America notæ, histrionica nempe & minuta, nova præterea sub nomine latirostra descripta; mergi boreales omnes; alcarum pulchræ differentia, rostro unifulcato vel colore notabiles; generis novi, Uriæ dicti, species & varietates; procellariæ, ut taceam pelagicam & glaciale, species novæ, puffinus; pelecani, præter eos e Fauna suecica notos, cristatus & phalacrocorax; rarissimæ, ornithologis hujus ævi nunquam visæ, catharactæ; colymbus torquatus norvegicus, ipsis Norvegiæ scriptoribus ignotus; larorum minus noti, argentatus & glaucus; sternæ varietas speciosa; grallas inter scolopax lapponica, falcinellus ignotus, tringarum species americanæ, lobatam puto & fulicariam, alpina quoque cum reliquis novis, suecorum rarissima avosetta, illisque nunquam visæ: fulica, chloropus dicta, & passerres inter loxia atra, quæ nisi americana *Catesbeji*, plane ignota.

Huic collectioni quantum contulerit Dnus. *de Petersen*, curiæ militaris in castello insulæ cujusdam maris balthici, *Christiansøe*, actuarius, vir ex historia naturali fatis bene meritus, patet ex crebris hujus insulæ ex-

cita-

citationibus. Cimbricas aves imprimis misit spectatissimus vir Dn. *Teilmand* S. R. M. Centurio militaris & Dnus. prædii *Endrupholm*, cujus in historia naturali labores laudem nostram multum superant. Pelagicarum rarissimam iconem illustratam, unacum aliis e fratris prædio *Lönborregaard* misit amicorum optimus, Dnus. *C. Hansen*. Grönländicæ & Islandicæ mercatoribus & nautis debentur. Feröenses & Norvegicas suppeditabant nonnulli per-illustris possessoris amici, sicut etiam Siælandicas donarunt alii.

Aves danicas, extra museum visas, vel e scriptoribus patriæ tantum notas, ad musei defectus supplendos & ornithologiam danicam hodie notam integram sistendam, minoribus typis & absque numeris suis inferuimus locis. Autores danici, qui nostro scopo maxime inferviebant, sunt E. Pontoppidani historia naturalis Norvegiæ; Jo. Ström̃s descriptio tractus Söndmör Norvegiæ; Acta Nidrosiensia, quoad historiam naturalem imprimis E. Gunnero autore; nec tacenda magna cum æstimatione nominati Dni. *Teilmand* descriptio parochiæ Cimbricæ vulgo Skadsherred dictæ, quam, typis nondum mandatam, venia auctoris perlegimus.

Colymbos in Fauna suecica descriptos, tridactylos, a reliquis hujus generis tetradaetylis separatos, sub novo descripsimus Uriæ genere; reliquos inter secundum pedes palmatos vel lobatos fecimus distinctionem; Larvæ parafiticum denique sub novum catharactæ genus reduxi-
mus.

Quas longo itinere, ingenti labore & multis sumptibus alii collegerunt aves, has intra mœnia vidimus, descripsimus, patriæ dedimus &, quantum in nostra fuerit potestate, ab injuria temporis & noxa insectorum vindicavimus.

HAFNIÆ 1764. d. 20. Februarii ex Museo.

Falco.

Falco.

1. 2. **L**ANARIUS *mas & fœmina, Fn. 62.* Ferroenſibus Smirle. Mas magnitudine columbæ, fœmina paulo major; maculæ caudæ & alarum, in mare ruſeſcentes, in fœmina magis albidæ. E *Siælandia, Islandia & Feroa.*
3. MILVUS, *Fn. 57.* Danis Glente. Magnitudo galli. Tota avis ſecundum pennarum ſcapos longitudinaliter maculata. E *Siælandia.*
4. 5. TINNUNCULUS *m. & f. Fn. 61.* Cimbris Kirkeſfalt, nonnullis Spurrehøg. Magnitudo columbæ; fœmina a mare differt maculis alarum majoribus & cauda ferruginea, lineis 9. v. 10. tranſverſis notata; rectrices, exceptis intermediis, apice albent. E *Cimbria & Chriſtiansœ.*
6. GENTILIS, *Fn. 58.* Variat vivus cera vel ex flavo viridi vel cœruleſcente; hic a falconariis danicis Blaaefugl dicitur, ille Guulbeſ audit & ad venationem præfertur alteri, qui hieme tantum inſervit. Uterque a falconariis Glætsfalt audit. E *Siælandia*, habitat etiam in *Cimbria & Norvegia.*

7. ISLANDUS, albus, supra maculis cordatis minoribus nigris, rectrices albæ totæ, intermedia nigro vix fasciatæ.
8. ISLANDUS, albus, maculis cordatis majoribus, rectrices albæ, omnes nigro fasciatæ.
9. ISLANDUS, fuscus, in supina parte avis singula penna albida fasciis fuscis margineque albido; rectrices fuscæ albo fasciatæ; collum subtus album maculis longitudinalibus nigris; pectus & abdomen alba maculis cordatis nigris.

Utrum Falco Islandicus speciei sit singularis, vel ad alias notas referendus, nondum constat. Varietates sunt sine dubio 7. 9. quas soli Daniæ Regi vendere tenentur Islandi. Pretium quoque triplex pro triplici hac varietate Islandis solvendum a rege est constitutum: nempe pretium Falc. 7. in Islandia est 17. impp. dan. Falc. 8. 10. impp. Falc. 9. 7. impp. Hafniam singulo anno ex Islandiæ portu *Holmenshavn* transportantur falcones hi, qui postea, venatione edocti, ad varias aulas principum munera inter septentrionis rariora mittuntur.

10. II.

Maximi & robustiores hujus generis *Danis Ørne*, rusticis quibusdam *Norvegiæ* *Øre*. Minores *Falk v. Høg*, *Norvegiæ* *Houf* dicuntur.

10. 11. SUBBUTEO *m. & f. Fn. 59.* Siælandis lærke-
Falk. Abdomen & collum subtus in altero sexu
ex albo magis sunt lutescentia. E *Cimbria*,
habitat etiam in *Siælandia*.

F. gentilis, Islandus & subbuteo in villa regia pro-
pe *Hafniam* ad venationes instruuntur. Rectrices læ-
sæ v. detritæ reparantur a falconariis addendis aliis,
acubus nempe belgicis ad basin veteris pennæ novam
affigunt; quod observatione dignum, ne descripto-
res, tali artificio decepti, novas effingant species vel
varietates.

12. ALBICILLA, *Syst. Nat. 41. 8.* Norvegis Fiske-
Ørn. *Descr.* Cera, rostrum & pedes flava;
corpus e rufo fuscum, abdomen pallidum macu-
lis oblongis rufis; remiges nigræ immaculatæ;
cauda subcuneiformis, rectrices a basi ad medi-
um nigræ, altera medietate alba, apicibus exte-
mis nigris. Magnitudo anseris majoris. E *Siæ-
landia*, habitat etiam in *Norvegia*.

13. OSSIFRAGA, *Briffon. ornith. G. IX. 9.* Siælandis
Gaase-Ørn. *Norvegis land-Ørn. Descr.*
Pedibus lanatis ad medias tibias, quæ una cum
digitis luteæ, cera obscura, rostro nigro, gut-
ture piloso; corpus e fusco & ferrugineo macula-
tum, capitis plumæ basi albæ dein fuscae ferru-

gineo terminatæ; cauda rotundata rectricibus extrorsum nigris, introrsum ex albo nigroque fordidè nebulosis; ani rectrices albæ apicibus nigris. Magnitudo præcedentis. E *Siælandia*. & *Islandia*.

Incertus hæreo, utrum sit varietas *F. chrysaethos* Linn. *syst.* 41. 2., qui habitat in Cimbria & Norvegia *Ström. söndm.* p. 261. an nova species?

14. TORQUATUS, *Brissøn. ornith.* VIII. 7. *Pontoppid. atl.* dan. T. I. t. 25. f. I. p. 616. *Descr.* Rostro nigro, pedibus exilibus flavis; corpus superne obscure ferrugineum, inferne ex albo rufescens, maculis longitudinalibus fuscis varium; rectrices caudæ superiores albæ ferrugineo maculatæ; caput torque cinctum; rectrices nigrae, laterales fasciis tribus ferrugineis: Fæmina. Magnitudo gallinæ. E *Christiansøe*.

An *F. pygargus* Linn. *syst.* 41. 9.? qui apud *Brissønium* idem cum *F. torquato*.

15. LAGOPUS cera pedumque lanatorum digiti nudi lutei, corpus nigrum albo maculatum, rectrices albæ versus apicem nigrae. *Descr.* Magnitudo gallinæ, pedibus plumosis ad talos usque; cera rostri pedumque digiti lutei; corpore nigricante albo

albo sparsim maculato; caput, collum & pectus alba maculis longitudinalibus nigris; abdomen nigrum; femora & pedes tegunt pennæ albæ, rachi & macula longitudinali nigra notatæ; remiges primariæ nigræ, secundariæ cinereæ intus albo maculatæ; rectrices a basi ad medium albæ, altera medietate nigra albo terminata; uropygium subtrus album. E *Christiansöe*.

ÆRUGINOSUS, *Fn. 66. Ström. söndm. 235. in Norvegia Høusehøg, Dørry: Glente.*

APIVORUS, *Fn. 65. Ström. söndm. 235. in Norvegia & Sialandia, Danis Muse: Høg, Muse: Waage, quia mures strigis instar persequitur.*

NISUS, *Fn. 68. Ström. söndm. 235. in Norvegia & Cimbria, Danis Spurre: Høg.*

HALLÆTUS, *Fn. 63. Ström. söndm. 225. in sylvis Norvegia passim degit, pisces tamen sæpe venatur, hinc Fisse: Gise audit; in Cimbria raro visus.*

BUTEO, *Fn. 60. Ström. söndm. 251. in alpinis Norvegia, ubi e macula sub singulis alis Skior: Bænge, Orne: Falf autem, quia aquilas licet minor persequitur, audit.*

Nomina Norvegica Fjeld: Orn & Slag: Orn quo sint referenda nescio.

Strix.

16. OTUS, *Fn.* 71. Danis *Horn-Ugle*. E *Christiansøe & Cimbria*.
17. ALUCO, *Fn.* 75? Corpore luteo, maculis longitudinalibus fuscis vario; remiges & rectrices areis nigris luteisque alternis variæ. *Pontoppid. atl. dan.* I. t. 25. f. 5. *Strix flammea*. Danis *Kat-Ugle*. *Descr.* Caput, collum, pectus, dorsum alæque lutea, nigro longitudinaliter maculata; abdomen magis albicans, singula penna linea longitudinali nigra notatur, ani pedumque rectrices albidæ immaculatæ. Alæ complicatæ cauda longiores, remiges 1 - 3. subæquales, omnes areis nigris luteisque alternis 3. v. 4. variæ, spatia nonnulla lutea punctulis nigris velut aspergine quadam irrorata. Rectrices luteæ apicibus albidis, omnes areas 5. v. 6. nigras obtinent; areæ intermediarum luteæ, macula nigra gravidatæ. Rostrum unguisque nigricantia. Magnitudo cornicis. E *Christiansøe*, habitat frequens in *Cimbria & Sielandia*.

Si conferantur descriptiones *strigis funerea* apud Linnæum & Brissonium, plurima conveniunt cum descriptione nostra tam præcedentis tam sequentis speciei, ideoque dubito strigem funeream speciem esse distinctam.

18. STRIDULA, *Fn.* 77. Danis *Nat. Ugle*. Tota avis ex albo, nigro ferrugineoque per maculas & undulas variegata. Alæ complicatæ cauda breviores, remigum prima plus palma brevior tertia quartaque; rectrices areis nigris luteisque variæ, intermediae binæ luteæ, nigredine irroratæ, omnes apicibus acutis; Rostrum albicans, ungues nigri, pedum tegetes albæ, punctis aspersæ nigris. Brissonii descriptio *ornith.* XII. 1. optime quoque in nostrum quadrat exemplar. E *Christiansøe*.

19. ULULA, *Fn.* 78. Danis *Ugle*. E *Norvegia*, *Siælandia* & *Christiansøe*.

20. PASSERINA, *Fn.* 79. *Pontopp. atl. dan.* I. t. 25. f. 3. *Strix funerea*. Danis *Kraf. Ugle*, E *Christiansøe* & *Cimbria*.

BUBO, *Fn.* 69. *Ström. söndm.* 225. in *Norvegia*, ubi *Berg. Ugle*, aliis *Ratt. Ugl.* Hanc dicitur,

NYCTEA, *Fn.* 77. in *Islandia*, *Andersf. relat.* p. 40. c. fig.

Lanius.

21. 22. EXCUBITOR *mas.* *Fn.* 80. *Brisson. ornith.* XXI. 1. & *fæmina*. Incolis *Christiansøe Hapar*, *Cimbris* & *Siælendis Tornstæde*, *Norvegis Klat*

vert. *Fœmina* mare paulo minor, differt ab eo collo, pectore & abdomine, quæ albida, lineolis innumeris transversis fuscis undulata. E *Christiansœ*.

23. 24. COLLURIO *m.* & *f.* *Fn.* 81. *Brissonio* diversæ sunt speciei sc. XXI. 3. & 4. *Siælandis* *Tornsfade*. *Norvegis* *Hantvarf*. E *Christiansœ*.

25. 26. GARRULUS *m.* & *f.* *Fn.* 82. *Mas* alarum membranulis coccineis gaudet septem, *fœmina* tantum 5. E *Christiansœ* ubi *Skitteren* dicitur, in *Siælandia* & *Norvegia*, ubi *Sieden* v. *Sieben* *Evands* audit, haud infrequens.

BIARMICUS, *Fn.* 84. ad danicas aves ab *Edwardo av.* 55. refertur, *Angliam* per principem fœminam *Dnam de Albemarle* advectus.

CORVUS.

27. CORAX, *Fn.* 85. *Danis* *Ravn*, *Norvegis* *Korp*. Habitat ubique.

28. VARIUS, ex albo nigroque varius. *Danis* *Hviid Ravn*; an *Brissonii* *Corvus cornix* varia XIV. 2. A? *Descr.* Alba sunt caput (excepto vertice nigro) rostrum & ungues, tectrices narium, collum subtus, venter, remiges 1 - 17. earumque tectri-

rectrices, atque rectrices duæ intermediae; reliqua pars avis nigra. E *Feroensibus insulis*, ubi in rupibus seorsim a C. corace habitare dicitur.

29. CORONE, *Fn.* 86. Danis *Blaae-Raage*. E *Sialandia & Feroa*.

30. CORNIX, *Fn.* 88. Danis *Krage*, Norvegis *Kraake*. E *Christiansøe*. Habitat ubique.

31. MONEDULA, *Fn.* 89. Danis *Ullise*, Norvegis *Kaae*, *Kahe*, *Ravnkaate*, *Raage*. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia*, *Sialandia* & *Cimbria*.

32. PICA, *Fn.* 92. Danis *Skade*, *Huussskade*; Norvegis *Skære*, *Skior*, *Tunfugl* & domicilia hominum amans avis. Picam albam e *Norvegia* olim possidebat *Ol. Wormius*, *Mus. Worm.* p. 293.

33. GLANDARIUS, *Fn.* 90. E *Sialandia*, ubi *Skoy* *Skade* dicitur.

34. CARYOCATACTES, *Fn.* 91. Danis *Nøddefrige*, Norvegis *Nøt-Kraake* v. *Nøddeffriger*. E *Christiansøe* & *Sialandia*, habitat quoque in *Norvegia*.

INFAUSTUS, *Fn. 93. Ström. söndm. 225.* Danis & Norvegis Giertrudsflugl, Ulyksflugl. Hunc esse Norvegorum Fjeld, Skior v. Fjeld, Skade existimat R. D. *Ström* l. c. eundemque facit cum Scriptorum Norveg. Skovskade, an *C. Glandarius*? In *Sialandia* prædio quodam *Gavnöe*, quod hodie possidet Excell. Ordinis Elephantini Eques D. *Otto de Thott*, capta fuit avicula ab autoptis parva, rubra, audacissima simulque minus nota descripta, quam hujus fuisse speciei existimo.

Coracias.

35. GARRULUS, *Fn. Sv. 94.* Danis Ellekrage. E *Sialandia* & *Norvegia*.

Cuculus.

36. CANORUS, *Fn. 96.* Danis Gjøg, Kufert v. Kuf, Cimbris etiam Kuf, Manden, Norvegis Gouf. E *Christiansöe*, habitat in *Sialandia*, *Cimbria* & *Norvegiæ* parte australi.

Jynx.

37. TORQUILLA, *Fn. 97.* Danis Bendehals, Drenhals. E *Sialandia* & *Christiansöe*.

Picus.

Picus.

38. MARTIUS, *Fn.* 98. Norvegis Træe:Kloppe, Træe:
Pisse, quæ nomina etiam sæpius sequentibus
tribuuntur speciebus. E *Norvegia*.
39. VIRIDIS *Fn.* 99. Danis & Norvegis Grøn:Spætt.
E *Siællandia*.
40. MAJOR, *Fn.* 100. Danis Hakke:Spætt. E *Chri-
stiansøe & Norvegia*.
41. MEDIUS, *Fn.* 101. Danis Flag:Spætt, Flæk:
Spærre. E *Siællandia & Christiansøe*.
- MINOR, *Fn.* 102. *Ström, söndm.* 260. 4. in *Norvegia*.

Sitta.

42. EUROPEA, *Fn.* 104. Danis Spætt:Meise, Nor-
vegis Matt:Wase; Egde? E *Siællandia*.

Upupa.

43. EPOPS, *Fn.* 105. Danis Herfugl. E *Siællandia
& Christiansøe*.

Cer-

Nomina danica *pici majoris & medii* non sunt propria sin-
gula speciei, sed jam uni jam alteri tribuuntur,

Certhia.

FAMILIARIS, *Fn.* 106. ad *Sialandia* aves notas ab aut-
optis sub nominibus danicis Træpikke v. Liehesten
refertur.

Anas.

44. CYGNUS, *Fn.* 107. Danis & Norvegis Svane.
Habitat ubique in oceano & lacubus; missus ex
Islandia. Varietas hujus datur, a tuberculo ro-
stri carnoso *Cimbris* Snabel-Svane dicta.
45. TADORNA *mas* crista carnosa ad basin rostri, re-
migibus unicoloribus.
46. - - - - - varietas alia remigibus, exceptis
extimis, apice albis.
47. - - - *fæmina* crista rostri nulla. *Fn.* 113.
Danis Grav-Gaas, Brand-Gaas, Norve-
gis Ring-Gaas, Fager-Gaas, Ur-Gaas,
Rød-Bælte, Feroensibus Hav-Simmer,
Islandis Uvæfong. E *Sialandia*, *Feroa*, *Islan-*
dia, *Norvegia* & *Cimbria*.
48. 49. FUSCA *m.* & *fæmina*, hujus tempora vix al-
bicant, abdomen ex albo fuscoque sordide macu-
latum. *Fn.* 109. *Gunner. nidros.* I. 259. t. 5.

Incolis

Incolis *Christiansøe* Sværte, Norvegis Søe-
Drre; Hav-Drre, v. Sav-Drre, rusticis qui-
busdam Sorte. E *Christiansøe* & *Norvegia*.

50. MARILA, *Fn.* III. Danis Polst Edelman. E
Cimbria.

51. - - - varietas: Caput & collum sericea ex vi-
ridi nigra, pectus, thorax, dorsum, alæ ut &
abdomen pone pedes e fusco alboque tenuissime
undulata: cetera cum præcedenti conveniunt.
E *Christiansøe*.

52. BERNICLA, *Fn.* I 15. Cimbris Kær v. Kær-Gaas,
Norvegis Kært v. Kærtne-Gaas item Goul
v. Gagl. In quibusdam collaris albi vix obser-
vantur rudimenta. E *Christiansøe*. Habitat in
Norvegia & *Cimbria*. Sonus, quem inter vo-
landum edunt, rusticis Cimbris nominis Karls
Jægere dedit occasionem.

53. ANSER *ferus* margine frontis albo, abdomine
cinereo immaculato. *Fn.* I 14. E *Cimbria* habi-
tat etiam in *Norvegia*, Danis Graaes v. Bild-
Gaas dictus.

54. - - - varietas fronte tota alba, abdomine
nigro maculato. E *Cimbria*; nonnullis minus
recte Trappe-Gaas.

55. AN-

55. *ANSER domesticus*, *Fn.* 114. *Tam* *Gaas*, hospitatur ubique.

56. *ERYTHROPUS*, *Fn.* 116. *Feroensibus* *Bram-Gaas* aliis *Helsing-Gaas*. *Ex Islandia, Feroa, Norvegia & Christiansøe.*

57. *MOLLISSIMA*, *mas* adultus quadriennis, *Fn.* *Sv.* 117. *mas.*

58. - - - - - adultus, triennis, coloribus minus saturatis, maculisque colli nonnullis nigris a præcedenti distinguitur, vertex niger postice bifidus.

59. - - - - - pullus biennis, collo pectoreque ex albo nigroque varie maculatis, vertice nigro.

60. - - - - - pullus annuus, dorso albo, remiges primores, rectrices, ima pars pectoris & abdomen nigra, reliquum corpus pennis nigris, albis vel nigro alboque variis tegitur.

Omnes e Christiansøe.

61. - - - - - *maris adulti varietas*, quadrienni similis basi alarum & dorsi medietate nigris. *E. Feroa.*

62. - - - - - *femina* linea alarum transversa duplici alba *Fn.* 117. *femina.* *E. Christiansøe.*

63. *MOL-*

63. MOLLISSIMA, fœm. *varietas* 1. præcedenti similis
sed pennis plurimis albis in toto corpore macula-
ta. E *Christiansœe*. Incolis nunquam antea visa.
64. - - - - *varietas* 2. nigra collo & abdo-
mine cinereis, linea alari vix conspicua. E *Feroa*.
65. - - - - *varietas* 3. præcedenti similis, sed
absque linea alari. Ex *Norvegia*.
66. - - - - *pullus* aliquot dierum, lanugine fu-
sca vestitus, guttur & pectus albida, linea cine-
rea a rostro per oculos ad nucham ducitur. Sin-
gula pluma s. lanugo apice setigera est, hinc ap-
paret totum corpus quasi pilis tectum. Pulli mâ-
ris & fœminæ sunt concolores.

Danis Ederfugl. Quæ de *A. Mollissima* ejusque va-
rietates quoad autores, nomina, loca & œconomiam
integram constant, videantur in *Monographia* nostra
danice edita *Hafn.* 1763. c. figg. cujus jam exstat
versio germanica,

67. 68. PLATYRYNCHOS *mas* & *fœmina*, *Fn.* 120.
Siælandis Rop: And, Bornholmis Stof: And.
Color fuscus in altero sexu, ut puto mare, ma-
gis ad cinereum vergit, & ferrugineus ad albe-
dinem. E *Siælandia* & *Christiansœe*.

69. PLATYRYNCHOS, *varietas*, in qua fere deleta est macula cœrulea s. smaragdina alarum, licet aliis notis certo dignoscatur species. E *Christiansœe*.

70. CLANGULA *mas.* Fn. 122. Norvegis ex annulo oculi albo Ring: Dye. E *Christiansœe* & *Islandia*.

71. - - - *fœmina* capite cæsio-rufescente, ad finum oris plumæ aliquot albæ, vel in aliis nullæ, linea alaris alba; cetera cum descriptione Fn. *Svec.* conveniunt. E *Christiansœe*.

Norvegis ex stridore Hvinn: v. Dvinn: And; ex macula ad finum oris alba, qua ad Lunden 3: Aleam arcticam accedit, Lund: And aliis. dicitur; incolis *Christiansœe* Bruus: Rop v. Blauke: Kniv. E *Christiansœe* & *Islandia*, habitat etiam in *Norvegia*.

72. 73. PENELOPS *m. & f.* Fn. 124. *fœmina* macula alari alba caret, sed lineis 2. albis gaudet. Danis Brun: Nasse, Bles: And. E *Christiansœe*.

74. - - - *varietas*, ut videtur, maris, macula alari tantum azurea nitet, reliquis caret, *fœminæ*, ea excepta macula, simillima. E *Christiansœe* sub nomine Græs: And.

75. HIE-

75. HIEMALIS, *Fn.* 125. incolis *Christiansøe* Gaddissen, *Klaeshavn*. Norvegis, *Ungle*, *Ungeltasse* v. *Troesører*.

Regio circa oculos pallide grisea, utrinque infra oculos macula magna oblonga nigricans; pennæ humerales in exemplaribus mihi visis albæ, longiores & acuminatæ, supra alas complicatas dependentes. E *Christiansøe*, habitat etiam in *Norvegia*.

76. - - - Differt a præcedenti tania verticali nigra, pennis humeralibus nigris ferrugineo marginatis, & collo maxima ex parte nigricante. *Willughb.* *Anas Island.* *Havelda*, p. 290. Huic similis *Querquedula Ferroensis Brissonii ornith.* XXIV. 40. quæ a nostra differt rectricibus elongatis nullis, ideoque forte varietas. Ex *Islandia* & *Feroa*, hic *Dedel*, ibi *Ha: Ella* v. *Ha: Old* dicta.

77. - - - *Fn.* 133. Capite albo, vertice & macula laterali nigris, pectore cinereo, collum, abdomen & pennæ humerales albæ; reliqua nigra etiam rectrices, quæ omnes acuminatæ, elongatis nullis. E *Christiansøe* sub nomine *Dykker*.

78. HIEMALIS, Præcedenti similis, pennis humeralibus cinereis. E *Christiansøe*.

79. - - - - Differt a præcedente colore, loco nigredinis, fordide cinerascende. E *Christiansøe*.

Quomodo anates 75-79. differant vel ætate, v. sexu, vel specie, nondum constat.

80. FERINA, *Fn.* 127. E *Siælandia* sub nomine Brun-Masse, Norvegis Rød-Masse.

81. QUERQUEDULA *mas*, *Fn.* 128. Pennæ humerales longiores, singulæ linea alba secundum longitudinem rachidis notantur. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia* ibique Kref-And v. rusticis Saur-And dicta, quæ nomina etiam reliquis minutissimis tribuuntur speciebus.

82. CRECCA, *Fn.* 129. Cimbris Utteling-And, Norvegis Hestelort-And. E *Christiansøe* & *Siælandia*.

83. CIRCIA, *Fn.* 130. Danis Kriß-And, Caput, pectus dorsumque e fusco alboque varia, singula enim penna fusca albo terminata. Alarum basis, apex & margines fusca, macula alarum e viridi fericea, supra infraque nigra, antice & postice alba; remiges

remiges primores 10 omnino fuscae; linea capite pallidior a rostro supra oculos ducitur; abdomen album fusco maculatum, imprimis pone pedes. E *Christiansøe & Norvegia*.

84. HISTRIONICA, *Syst. Nat.* 61.30. Islandis Græv-
And v. Straum-And, mas: Caput, collum pectus e nigro coerulea, ad finem oris macula alba, a qua in utroque latere supra oculos ad nu-
cham usque ducitur linea ferruginea, interjacentem alia verticali nigra; macula auricularis alba, pone hanc in dorso colli utrinque linea decurrit alba, infra hanc collare album, dein ante alas in lateribus pectoris utrinque fascia transversa alba, in antica pectoris parte non coeunte. Abdomen obscure cinereum, latera abdominis ferruginea, remiges primores nigrae, secundariae a latere exteriori violaceae, postice albo maculatae, praeterea duplex macula alba in singula ala, una versus basin alae, ex macula pisiformi 2 aut 3 tectricum orta, altera praecedenti similis versus apicem tectricum. Cauda acuta nigra. Ex *Islandia* plures hujus anatis exuviae diversis annis allatae sunt, hoc vero anno unam cum specie sequenti n. 86. sub communi nomine *Straum-And, mas & femina* accepimus.

85. HISTRIONICÆ, tantummodo *Caput*, in quo unguis rostri lineis notatur 2. albis divergentibus instar literæ V, angulo apicem respiciente. Ex *Islandia*. An lusus naturæ?
86. MINUTA. *Syst. Nat.* 61. 31. Corpore fusco, abdomine albo maculato, gula, regio sub oculis, macula temporalis supra oculos, nucha & regio aurium albescentia; cauda acuminata. Hanc ex *Islandia* sub nomine *Strøm-And* fœmina una cum A. histrionica accepimus. Multa habet communia cum *Anate ignota Ström. jöndm.* p. 230. descripta.
87. BOSCHAS *fera*, *Fn.* 131. Norvegis *Blaæhals* v. *Græs-And*, etiam nonnullis *Stof-And* dicitur. E *Norvegia*, *Islandia* & *Groenlandia*, habitat ubique.
88. - - - *domestica* multis ludens coloribus, Danis *Tam-And*; hospitatur ubique.
89. GLAUCION fœmina, *Fn.* 123? Danis *Krefflop*, Cimbris *Dyffer*. Alarum remiges secundariæ 6. distinctæ albæ; ad sinum oris puncta nonnulla exalbida. Convenit cum descriptione anatis Glaucii Bellonii apud *Willughb. ornith.* p. 281.
90. Fu-

90. FULIGULA; *Fn.* 132. Norvegis Troid: And.

91. LATIROSTRA rostro ampliato, corpore supra nigro, linea alari alba; pectore & abdomine albis, hypocondriis ferrugineis. E *Christiansøe*.
Descr. Rostro lato ampliato; capite, collo thoraceque ex spadiceo fusca, caput ad basin rostri pallide flavesens; dorsum, alæ & cauda nigra; remiges secundariæ albæ apice nigræ, hinc linea alaris alba; pectus & abdomen alba postice cinerea; tectrices hypocondriorum ferruginæ.

NIGRA, *Fn.* 110. *Ström. sondm.* p. 230. Norvegis Svart: And.

STREPERA, *Fn.* 121. Cimbris Rnarre: Gaas.

CLYPEATA, *Fn.* 119. Danis Krop: And. Norvegis Stof: And, Cimbris Leffel: And, nobis visum exemplar R. Dno. *Tyrholm e Norvegia* missum.

Mergus.

92. MERGANSER, Islandis Skior: And. *Willughb. orn.* p. 253. *Marsigl. Danub. t.* 37. *Briss. orn. Gen.* CV. *sp.* 1. *tab.* 22. *mas.* Caput & colli superior pars ex nigro viridis, pennæ capitis solito longiores & tumidæ, cristam tamen non formantes, reliqua pars colli, pectus & ab-

domen alba; dorsum antice nigrum, postice ut & regio uropygii cinerascens, nigro tenuissime undulata; cauda cinerea, rectricum scapis nigricantibus; remiges primariae nigrae, secundariae ut & posticae nonnullae albæ, quibusdam nigro marginatis, reliquæ nigrae; rectrices alarum albæ, exceptis paucis ad basin alæ cinereis, & intermediis majoribus versus earum basin nigricantibus. Magnitudo fere anseris. Ex *Islandia*.

93. RUBRICAPILLA. Danis Skallesluger. Caput & colli pars suprema fordide rufa, pennis capitis solito longioribus, cristam tamen non formantibus, dorsum colli ex viridi sericeo hinc & inde splendens, gula albo nigroque varia, infima pars colli alba, hanc albedinem a rufo colore colli supremi distinguit angusta nigredo. Pectus & abdomen alba; dorsum, uropygium & cauda cinerea. Remiges primariae nigrae, secundariae nonnullae nigrae, intus & apicem versus albidæ, aliæ albæ, interiores longiores & canescentes; Alarum rectrices cinerae, majoribus intermediis apice candidis. Rectrices cinerae scapo nigricante. Rostrum viridescens, pedes & digiti colore aurantio tincti, membrana natatoria coloris

coloris plumbei. Magnitudo præcedentis. *Will. orn.* 253. Merganser femina. *Briss. ornith.* CV. 1. *femina*. Captus circa *Hafniam* & vivus descriptus.

94. CRISTATUS *mas*, *Briss. ornith.* CV. 2. Merganser cristatus mas; *Linn. Fn.* 135. Mergus merganser mas; Danis *Tøp: And, Skælle*; Norvegis *Mort: And, Spil: And, Fiss: And*, quæ nomina quoque aliis tribuuntur hujus generis speciebus. Præcedenti minor, crista dependente longa; dorsum postice cinerascens nigro tenuissime undulatum, pectus testaceum nigro maculatum, rectrices alarum in basi alæ cinereo fusæ, has excipit macula magna candida per duas lineas nigras trifariam divisa. Descriptio *Brissonii* optime convenit. E *Christiansøe*.

95. CRISTATUS *femina*. *Briss. orn.* CV. 2. Merganser cristatus femina; *Linn. fn.* 135. femina; Præcedenti similis, exceptis iis differentiis, quas l. c. indicat *Brissonius*. Nomina danica huic cum præcedenti sunt communia. E *Christiansøe*.

96. SERRATUS; *Fn.* 136. *Briss. orn.* CV. 7. Vertex capitis & crista fusca, latera capitis & colli

reliqua pars cinerea, pectus & abdomen alba; dorsum, uropygium, alæ & cauda cinereo fusca absque undulis; macula alaris alba in duas per lineam nigram divisa; tectrices alarum nigræ, exceptis illis, quæ immediate remiges secundarias tegunt, basi nigris, apice albis; remiges primores nigræ, secundariæ nonnullæ a basi ad medium niveæ, reliqua parte alba; corpori viciniore cinereæ v. fuscæ. Danis *Gist. Aud. E Christiansøe.*

97. ALBELLUS, *Fn. 137. Briffon. orn. CV. 3, mas*; Ad sinum oris macula nigra. E *Cimbria*, ubi *Hviid. Side* dicitur.

98. - - - Differt tantum a præcedenti vertice & occipite rufo, fronte alba, macula nigra ad sinum oris magis notabili. Captus circa *Hafni- am*. An *M. Minutus*?

99. GLACIALIS, Danis *Søe. Stierne*. Capite rufo, gula alba, collum & dorsum cinerea, pectus & abdomen alba; alæ nigræ macula alari magna alba, dein macula nigra per lineam albam divisa, & linea alia alba terminata; Abdominis latera antica non undalata, ut sunt in *M. albello*, cui magnitudine est æqualis. Mergus glacialis Gesn.

Wil.

Willughb. orn. p. 254. An fœmina *Albeli*
apud *Briffon.* descripta. E *Christiansœe.*

Alca.

100. TORDA, *Fn.* 139. Norvegis *Åluf-Ålfe*, *Ålmyrpe*, *Islandis* *Ålsta*, *Ålumbr*, *Ålumburnevia*, *Ålumbenefia*; *Grönlandis* *Åmarsuf*; *Danis* *Ålfe*.
Ex *Islandia*, *Grönlandia* & *Norvegia*.
101. BALTHICA præcedenti simillima, sed subtus tota a rostro ad caudam candida; linea a rostro ad oculos nulla. *Pontopp. atl. Tom.* I. t. 36. E *Christiansœe* ibique *Mule* dicta.
102. UNISULCATA, similis *Tordæ* sed rostro minus lato, magis protracto, & unisulcato. *Ström. söndm.* p. 219. Ex *Islandia* & *Norvegia*, occisa quoque circa *Hafniàm*.
103. ARCTICA, *Fn.* 141. *Islandis* & *Norvegis* *lund*, quibusdam *Islandske* *Papegone*, hujus pulli *lund-Toller*. Habitat in *Islandia* & *Norvegia*.
104. DELETA, similis proxime præcedenti sed rostrum unisulcatum, *Mæbr. av.* - - - Ex *Islandia*; plures hujus speciei exuvias sub examen revocavimus.

105. IMPENNIS, *Fn.* 140. Islandis Ghr: v. Geyr:
Fugl, Norvegis Fiert, Anglemage, Penguin,
Brille-Fugl. *Ex Islandia & Norvegia.*

106. ALLE, *Fn.* 142. Grönlandis Alspaliarsof, Islandis
Halkion v. Haudirdell, Norvegis Soelonge,
Jakob, Soren Jakob, Perdriffer, Perdyk:
ker, Persuper, Boesfiær, Borrefiær, Hys
Thomas interdum Trolsfugl. Feroensibus Fuls:
kop, Martensio Rottet.

Descr. Rostro brevi, crasso, conico, convexo,
vix fulcato, naribus ovatis, pars avis supina ni:
gra, puncto supra oculos albo. Collum subtus
ex albo nigroque undulatum; alba sunt gula &
latera capitis infra oculos, pectus, abdomen,
cauda subtus, linea alarum transversa ut & lineo:
læ aliquot longitudinales supra dorsum; pedes
flavescentes. Magnitudo Sturni vulgaris. *Gunn.
nidros.* I. 261. t. 6. *Martensf. spitzb.* 61.
t. M. c. *Briffon. ornith.* XCII. 2. *fæmina.*
*Ex Islandia & Norvegia, occisa etiam in
Cimbria.*

107. CANDIDA, alba tota, ceterum quoad magnitudi:
nem & omnia, solo colore excepto, *Alcæ alle*
simillima. *E Groenlandia.*

An Varietas præcedentis?

URIA.

Uria.

Character generis: Rostrum oblongum, compresum, subulatum. Pedes tridactyli, pone æquilibrium.

108. LOMVIA, *Linn. syst.* Alca lomvia, *Willughb.* t. 65. Islandis & Norvegis Lomvie, Langgovie, Lomvisvie & per excellentiam Storfugl. Magnitudo cornicis; caput, collum, alæ supra, dorsum, remiges & rectrices nigræ; alba sunt pectus, abdomen totum etiam lateribus, ut & apices remigum secundariarum; a cantho oculi exteriori in latera colli futura decurrit capiti concolor. E *Christiansøe & Islandia.*

109. TROILLE, *Fn.* 149. Islandis Stutnesfur. Lomviæ in omnibus simillima, excepto rostro latiori & breviori, cujus margines, etiam in exsiccatissimis exuviis, flavescunt.

110. SVARBAG, Islandis Svartbafur. Differt a præcedenti tantum quod a gula ad caudam, ut & in lateribus capitis, sit alba, linea nigra ab oculis per latera capitis alba ducitur. Rectrices apice albæ.

111. RINGVIA, Islandis Ringvia. Præcedenti similis, sed linea a cantho oculi exteriori per latera capitis nigricantia decurrit alba.

112. ALGA, Danis Nalge. Præcedenti simillima, exceptis rectricibus totis nigris.

Quomodo hæ aves differant, vel sexu, vel ætate v. specie nondum constat.

113. GRYLLE, *Fn.* 148. *Briffon. orn.* XCII. 3. Islandis Zeista, Groenlandis Sarpaf, Norvegis Zeiste. Ex *Islandia, Groenlandia & Norvegia*.

114. GRYLLOIDES, *Linn syst.* Alca grylle. Abdomine ex albo & nigro vario, ceterum cum præcedenti n 113. simillima. Pullus primi anni *Gunn. nidros.* I. p. 268.

115. BALTHICA, *Ström. söndm.* p. 258. Præcedentibus duabus magnitudine & statura æqualis; dorsum nigrum marginibus quarundam pennarum albis; cauda alæque nigræ, macula alaris alba ut in antecedentibus; caput, collum & pectus alba, nigro tenuissime maculata; abdomen niveum. E *Christiansöe*, incolis Sildeperris dicta.

116. - - - Præcedenti simillima, excepta macula alari alba, quæ in hac nigro est maculata;
Briffon.

Briffon. orn. XCII. 4. E *Christiansøe*, incolis *Sildeperris* cum præcedenti n. 115. dicta. Illam marem, hanc fœminam esse perhibent.

Procellaria.

117. PELAGICA, *Fn.* 143. Norvegis *Søren: Peder*, *St. Peders: Fugl*, *Bestenvinds: Åre v. Øre*, *Søndenvinds: Fugl*, *Uvehrs: Fugl*, nonnullis *Hare*, *Feroensibus Strunkvit*. Avis fœtida; per anum & os trahitur ellychnium, quod accensum alitur pinguedine corporis, & loco candelæ *Feroensibus* inservit. E *Feroa*.

118. GLACIALIS, *Fn.* 144. *Gunner. nidros.* I. pag. 182-202. tab. I. Nautis *Hav: Hest*, *Mallemose v. Mallemuse*. Alia videtur esse *Andersonii Island.* 173. sub nomine *Larus marinus maximus ex albo nigro & fusco varius*, *Groenlandicus*; descriptio enim ibi data magis competit *Procellariæ capensi*, quæ in museo quoque servatur, sed inter aves boreales haud numeranda.

119. PUFFINUS, corpore supra nigro, infra albo. *Will. orn.* 251. *L. Deb. færoa ed. angl.* p. 144. *Barthol. act. med. hafn.* I. 92. *Ström. fœndm.* I. pag.

pag. 243. *Briffon. orn. Gen. XCIX. Puffinus.*
 Feroensibus Skrahe. Norvegis Skraap, pullus,
 cujus varietates forte sunt *Briffonii puffinus* 1 &
 2. Feroensibus Lieren dicitur.

Descr. Rostrum subcylindricum, e pluribus os-
 ficulis quasi compositum, apex mandibulæ supe-
 rioris unguiculatus, aduncus; apex mandibulæ
 inferioris compressus decurvatus. Pars avis su-
 pina tota nigra, prona pars capitis, colli, caudæ,
 pectus abdomen etiam sub alis alba. Alæ com-
 plicatæ caudam æquant, remiges omnes nigræ
 margine intus pallidæ. Cauda subæqualis rectri-
 ces intermediæ reliquis vix longiores, omnes
 nigræ immaculatæ. E *Feroa & Norvegia.*

Avis pelagica, ideoque nota tantum Norvegiæ
 piscatoribus, qui *Star-Eggen* frequentant: Referunt
 illi nonnullæ macula caudali alba inprimis esse no-
 tabiles. *Ström. söndm. I. p. 243.*

Pelecanus.

120. CARBO, *Fn. 145.* Capite lævi, rectricibus 14.
 Norvegis Skarv, Strand-Ravn. E *Chri-*
stiansöe, Norvegia & Islandia.

Acari datur species, autoribus ignota, quæ *Carbo-*
nem valde infestat, estque pediculus, cujus mentio-
 nem fecit *Willughbejus orn. pag. 248.*

121. GRACULUS, *Fn.* 146. *Brissøn. orn.* CXI. 2.
Capite lævi rectricibus 12. Danis Halefrage,
Norvegis Skarv, Gisseren, Islandis Sma
Skarsur. E *Christiansøe, Norv. & Islandia.*
122. PHALACROCORAX, *Brissøn.* CXI. 1. *Ström-
föndm.* 250. Norvegis Betlaar, Hviiblaaring,
Blif-Skarv; Feroensibus Høpling, Student.
Præcedentibus major, niger violaceo undulatus,
gula alba; in lateribus abdominis ante femora
pennæ aliquot longiores niveæ. E *Norvegia
Islandia & Christiansøe.*
123. CRISTATUS, *Ström. föndm.* 250. Norvegis Top-
Skarv. E viridi cupreus vel niger; capitis
pennæ aliquot longiores cristam formantes.
Rectrices 12. Ex *Islandia & Norvegia.*
124. BASSANUS, *Fn.* 147. Nautis *Jan van Gent*, alias
Sule, Hav-Sule, Løssesugl?

Catha-

*Diomedæ exulantis ad Norvegiæ, ut fertur, occisi, ca-
put & pedes monstrantur Hafniæ in musæo R. Dni,
Volquartz. Ob similitudinem Diomedæ cum Procellaria
glaciali nonnullis Mallemyse dicitur.*

Catharacta.

Charact. gen. Rostrum rectum, subcylindricum, apice aduncum, cera instructum. Pedes tetradactyli, postico soluto. Lingua canaliculata, apice bifido.

Descr. gen. **ROSTRUM** breve, postice rectum subcylindricum. *Mandibula superior* convexa, apice gibbofo adunco; a basi usque ad partem aduncam cera instructum. *Nares* ad margines mandibulae in exortu partis aduncae lineares, magna ex parte cera rector. *Mandibula inferior* compressior, infra apicem obsolete angulata. *Lingua* canaliculata, subtus plana, marginibus erectis angulata, apice membranaceo bifido.

PEDES tetradactyli, tribus anticis palmatis, postico soluto, exiguo. *Ungues* validi, adunci, compressi, acuti; Unguis digiti medii a latere interiori margine prominet acuto. *Genua* extra abdomen, nuda.

ALÆ pro mole corporis magnæ.

Linn. syst. Gen. LX. *Larus*, *Brissou. orn. Gen.* CI. *Stercorarius*, *Mæbring. Av. Gen.* LXXI. *Buphagus*.

125. SKUA, corpore supra e fusco luteoque longitudinaliter maculato; macula alari alba; abdomine pallide lutescente, immaculato; cauda subæquali. *Willughbb. orn.* 265. Catharraetes noster, *Gannet* ut puto Cornubiensium. tab. 67. Skua Höyeri. *Ray. syn. av.* 128. *Clus. exot. auctar.* 369. Skua Hoyeri. *Sibbald. scot.* P. 2. l. 3. p. 20. t. 14. 2. Catharraetes nostras. *Mæhring. av. Gen.* LXXI. Buphagus. *L. Debes Fær.* edit. angl. p. 142. Skue. *Tho. Barthol. act. med. basn.* I. p. 91. Skue. *Pontoppid. norveg.* II. p. 157. Skue. *Ström. jöndm.* I. p. 238. Kav:Ørn? Feroensibus Skue. Islandis Skumr. Norvegis Kav:Ørn?

Descr. Magnitudo fere anseris. Caput, collum, dorsum & uropygium fusco luteoque longitudinaliter maculata; in dorso maculae nonnullae albicantes; Alae cauda paulo longiores, remiges omnes nigrae, a basi ad medium albæ, quæ

Phaëtontem demersum *Linnei* in Genus Catharraetis mutavit *Brissonus*; quoniam autem veterum *Catharraetes* eadem est cum nostra ave, nomen illud huic generi indere, optimum putavi.

quæ albedo in 5 primoribus ultra tectrices prominet, & maculam alarem albam format; tectrices alarum fuscae, anteriores immaculatæ, reliquæ margine maculisque lutescentibus versus apicem, notatæ; tectrices alas subtus regentes fuscae, immaculatæ; ala notha interior 1. spuria fusca. Cauda rotundata, rectrices 12. fuscae, basi albæ, duæ intermediae paulo longiores, omnes apice rotundatæ, margine vix cinerascente; tectrices caudæ superiores fuscae marginibus rufescentibus; pectus & abdomen usque ad caudam, & caudæ tectrices subtus e rufo cinerea. Ungues digitorum 3. anticorum validissimi, & magis quam in sequentibus hujus generis speciebus adunci. Digitus posticus absque membrana, brevissimus, ungue valido minus adunco munitus. Membrana natatoria supra infraque papillis scabris & innumeris referta. E *Feroa* & *Islandia*.

Forſan avis noſtra cuidam inſularum Færoenſium nomen *Skuøe* dedit. In defendendis ovis pullisque valde ſtrenua, nam in tranſeuntium capita, involat aliſque ſuis eos ferit; hinc incolæ, quibus ferocitas avis hujus nota eſt, cultrum erecta acie capiti imponunt, quo ſæpe tranſfigitur avis: *L. Debes.* Skuam inter-

interdum anates gallinasque, etiam agniculos prædari, mihi communicavit Chirurgus Færoensis Dnus. *Schröter*; idem testatur S. V. *Pontoppidan* in hist. norveg. II. p. 157. quod a Sibbaldo quoque refertur l. c. „Rapax, inquit, avis, querquedulas fimilesque „aves minores devorat. Conferantur ea, quæ *Willughbejus* de ave hac narrat l. c. Ob colorem ejus bæticum s. fuscum rufumque aquilam, si pedes non obstarent palmati, mentiretur; hinc puto eandem esse cum ave pelagica, Norvegis *Rav, Ørn* dicta; nec repugnant, quæ R. Dn. *Ström* l. c. de hac affert: „Avis, inquit, pelagica satis magna, sed minus „nota; describitur a piscatoribus, qui *Stor-Egger* „frequentant, magnitudine fere anseris, brevior li- „cet & crassior, collo quoque breviori; corpore „spadiceo, aquilini instar vario. Nomen *Rav, Ørn*, „quia frequenter urinatur, quod Norvegis *lave* dicitur, fortita est.“ *Clusii Exotica* nunquam mihi visa, ideoque autoptis hujus libri, ibi tradita addenda relinquo. *Linnao*, *Brissonio* & *Mæhringio* hæc & sequens §. 126. nunquam visæ sunt, *Mæhringius* tamen ex aliorum verbis figurisque suum condidit genus buphagi; *Linnaeus* & *Brissoni*us aliam sed ejusdem generis avem, nempe *C. parasiticam* suo in loco descripserunt, hic sub novo genere *Stercorarii*, ille sub genere *Lari*. Ex descriptione avis nostræ patet quoque falsas esse citationes *Brissonii*, qui *Skuam Hoyer*i excitat sub Genere *Lari*, specie 5, & ambas

has aves, licet diversas, confundit cum tertia Mallemucke s. Procellaria glaciale, antea vero sub specie 4. excitavit Catharraetam *Willughbeji*, licet eadem sit cum Skua, eamque confundit cum Catharraeta *Aldrovandi* proxime sequente §. 126.

126. CEPPHUS, Capite colloque luteis fusco longitudinaliter maculatis; reliquum corpus ex luteo fuscoque undulatum, abdomine pallidiore, macula alari alba, cauda subæquali.

Cimbris *Strand-Høg* 3: accipiter littoralis.

Avis hæc multa habet communia cum Catharraeta *Aldrovandi*, me iudice tamen ei quoque quadrat descriptio Cepphi *Aldrovandi*, imo figura posterioris magis cum nostra convenit, hinc incertus hæreo, utrum sit Catharraeta an Cepphus?

Descr. Magnitudo Parasiticæ, adeoque præcedenti, cui simillimus, multo minor; Caput & collum lutea, fusco longitudinaliter maculata. Reliquum corpus luteo, fuscoque undulatum, abdomine magis pallido. Dorsum alæque fusca, pennis omnibus apice testaceis vel albidis etiam sub alis. Alæ cauda paulo longiores, remiges nigræ, primores 5 a basi ad medium albæ, hinc macula alaris alba; rectrices alarum fuscæ, luteo terminatæ. Ala nostra fusca, singula penna apice & duabus paribus macularum albidarum

nota-

notatur. Hypochondriæ ex albo nigroque fasci-
catæ; colli prona pars, pectus & abdomen cine-
rea, marginibus fasciisque pennarum pallide te-
staceis. Cauda rotundata, rectrices nigrae basi
albæ, summo apice testaceo, duæ intermediae paulo
longiores, acutiores, rectrices caudæ subtus nigrae;
testaceo maculatæ. Ungues pedum minus adun-
ci in hac quam in præcedenti specie, sed validi
& acuti.

Occisa in *Cimbria* ad littus maris germanici, pro-
pe prædium *Lönborregaard*, inde missa per amicum
Dn. *Christianum Hansen*, S. S. Minist. Candidat., qu-
avem hanc, inde a tempore *Aldrovandi* ignotam,
ornithologis dedit novam, describendam. Eam for-
ma minori monstrat tabula ænea; magnitudo natu-
ralis patet ex capite & pede seorsim delineatis. Lin-
guam simul delineari curavi, quoniam in omnibus
speciebus eadem facies & figura, magnitudine tan-
tum diversa.

127. PARASITICA, supra nigra, collo pectore & ab-
domine albis; rectricibus duabus intermediis
longissimis.

Fn. 156. *Larus parasiticus*. Norvegis *Rhuffva*
v. *Thufva*, *Ton-Tiusva*, *Jo-Tyv*, *Rive*,
Rivjo, quibusdam *Strundjager*. Feroensibus
Truen.

E *Norvegia* & *Grönlandia*.

128. COPROTHERES, corpore toto fusco, rectricibus duabus intermediis longioribus.

Ström. söndm. I. 239. Ex Islandia & Norvegia.

Magnitudo & facies omnino præcedentis, corpore toto fusco, unicolori. An a præcedenti sexu vel specie diversa? A quibusdam hæc pro fœmina, illa §. 127. pro mare habetur.

Colymbus.

* Pedibus palmatis.

129. IMMER, corpore supra nigricante albo maculato, subtus albo toto. *Gunn. nidros. I. p. 246. t. 3. Pontopp. norv. II. p. 104. Ström. söndm. I. 236. Olig. Jacob. mus. t. 2. 22? Worm. mus. 303? Will. orn. 258?* Feroensibus *Jlðbrimet*, Islandis *Himbrime*, Norvegis *Havs Immer*, v. *Imber*, *lom-Imber*, *Embergaaß*, *Ommer*, *Morteferje-Deser*. Ansere major, supra totus obscure nigricans, marginibus pennarum pallidis v. albis, subtus totus albus. E *Færoa*.

Eum cum alio autoribus hodiernis æque ignoto, postea sub nomine *Colymbus torquatus* describendo, nec non cum proxime sequente §. 130. confundunt *Jacobaus*, *Wormius* & *Willughbejus*,

130. STELLATUS, corpore supra nigricante maculis stellatis albis innumeris, subtus albo.

Will. orn. tab. 62. Colymb. max. stellatus. Danis Søehane.

Magnitudine anatis majoris, ideoque præcedenti multum crassitie cedit.

Descr. Supra totus nigricans, maculis stellatis albis innumeris sparsus; subtus totus albus, excepto collo paululum cinerascens. E *Christiansøe & Sielandia.*

131. BOREALIS, corpore supra nigricante, maculis stellatis albis innumeris, subtus albo; collum antice rufo vix maculatum. Danis Hav-Gasse.

Descr. Præcedenti colore, magnitudine & statura similis, sed in parte colli prona pennæ aliquot ferrugineæ. Occisus circa *Hafniam.*

132. LUMME, corpore supra nigricante, subtus albo, collo antice ferrugineo.

C 4

Descr.

Colymbis 129 - 132. mandibula superior recta, colymbis 133 & 134. mandibula superior versus apicem parum inclinata. Omnes 129 134. fascia juxta anum gaudent nigra.

Gunn. nidros. I. p. 245. t. 2. f. 2. Ström. Jöndm. I. 243. Brissou. orn. XCVII. 3. Islandis & Norvegis Loom v. Lumme, Danis Lomm.

Descr. Magnitudinē præcedentis. Caput & latera colli grisea, antica pars colli macula oblonga rufa notatur; dorsum colli & latera pectoris lineis longitudinalibus albis nigrisque alternantibus pingitur; pectus & abdomen alba, dorsum fuscum immaculatum. Ex *Islandia, Norvegia & Grönlandia*, occisus quoque circa *Hafniam*.

133. ARCTICUS, capite & collo cinereis, gutture nigro-violaceo, dorso nigro maculis quadrangularibus albis.

Fn. 150. Gunn. nidros. p. 240. t. 2. f. 1. Willughb. orn. t. 62. Brissou. orn. XCVII. 4. Islandis Himber, Himbrime.

Descr. Caput & colli lupina pars cinerea, prona pars inde a jugulo e violaceo nigra, certo situ e viridi splendente; latera colli pectorisque lineis longitudinalibus albis nigrisque alternantibus picta; in gutture tænia transversa e lineis albis nigrisque alternantibus formata; dorsum nigrum maculis quadrangularibus albis pictum, pectus & abdomen alba. E *Norvegia, Islandia & Feroa*.

134. TORQUATUS; Capite colloque nigro-virescentibus, medium colli torque ex albo nigroque variofere cinctum; dorso nigro maculis quadrangularibus albis. *Briffon. orn. Gen. XCVII. sp. 6.* Norvegis Brusen, Grönlandis Tiulif.

Descr. Caput collumque nigro-virescentia, medium colli occupat torques latus, e lineis albis nigrisque alternantibus variegatus; in dorso colli latissimus, sub collo apicibus non coeuntibus; supra hunc in gutture tania similiter colorata, sed angustior & minor. Pectus & abdomen alba, latera pectoris e lineis nigris albisque alternis varia; dorsum alæ & cauda nigra punctis maculisque quadrangularibus, in scapulis majoribus picta. Ex *Islandia, Grönlandia & Norvegia.*

** Pedibus lobatis.

135. CRISTATUS, *Fn. 151.* Danis Topped og Halskraved Dylker, Topped Havskiære. Captus circa *Hafniam.*

136. AURITUS, *Fn. 152. mas.* Norvegis Søe-Ørre, Søe-Ørre. Bornholmis Søehøne. Islandis Glauesfitt. E *Christiansøe & Islandia.*

137. - - - *Fn. 152. femina.* E *Christiansøe.*

138. AURITUS, *Fn. 152. alia. E Christiansøe.*

139. - - - *Varietas*, a præcedentibus differt capite supra nigro lævi, linea angusta ab oculis ad collum alba; lateribus capitis & gula albis, lineis sinuosis nigris varie maculatis. *E Christiansøe.*

Larus.

* Digito postico nullo.

140. RISSA, albus dorso cano, rectricibus albis totis. Islandis *Ritsa*, incolis *Christiansøe Lille Solvet, Rotteren.*

Descr. Statura & colore *L. cani*, exceptis solis remigibus, harum 5 primores extremitatibus nigris, 3. & 4. summis apicibus albis, æstima margine interiori toto nigro. Loco quarti digiti gibbositas exigua. Rostrum flavum. Ex *Islandia & Christiansøe*, occisus quoque circa *Hafniam*.

„ Norvegis *Ryffie* dicitur larus magnitudine co-
 „ lumbæ, rostro flavo, capite, dorso alisque canis,
 „ colore capitis saturatiore; fronte, genis, alis sub-
 „ tus, pectore, abdomine, cauda & antica colli par-
 „ te nivea; angulis oris palpebrisque rubris; Remi-
 „ gum 5 primores extremitate nigræ, æstima margi-
 „ ne etiam nigro, duæ ultimæ (æstima?) apicibus
 „ albis;

„ albis; pedes nigri larini. Apud scriptores syste-
„ maticos non occurrit, ceterum multis convenit cum
„ L. cano *Linnaei: Ström. fönadm.* I. p. 241. sq. De
numero digitorum non loquitur R. Autor; si igitur
est tridactylus, idem foret cum nostro *Rissa*,
cui descriptio optime convenit.

** Digito postico.

141. CANUS, *Fn.* 153. Ex *Islandia*.

142. FUSCUS, *Fn.* 154. *Islandis Beydebjalla. Danis*
Sildemaage. Ex Islandia & Christiansöe.

143. - - - *varietas*, præcedenti similis, sed remi-
gum prima extremitate alba, nigro maculata.
E *Christiansöe*.

144. - - - *pullus*, *Fn.* 154. *Islandis Gramasur,*
Feroensibus Skure, Norvegis Sve: Unge.

145. MARINUS, *Fn.* 155. *Danis Blaae: Maage.*
Norvegis Svartbag, Hvarmaase.

Descr. Albus, dorso alisque nigris, remigibus
omnibus nigris; 5 primores apice detritæ, vix
pallide albicantes, primus ante apicem macula
alba

Lari nomen genericum *Danis Maage, Norvegis Maase,*
Islandis Mausr.

alba notatur, reliquæ remiges omnes apicibus albis; rostro flavo, mandibula inferior versus apicem tinctura crocea. Magnitudine *L. fuscum* superat. Ex *Islandia*.

146. MACULATUS, rostri apice nigro; totus ex albo cinereoque maculatus; remiges extimæ totæ nigrae; rectrices a basi ad medium albæ, in altera medietate nigrae apicibus albis, excepta laterali tota alba: Magnitudine *L. cani*, Habitat circa *Hafniam*. An pullus?

147. - - - *varietas*, præcedenti similis sed paulo major; rostro nigro toto, nec huic rectrices laterales albæ.

148. GLAUCUS, totus albus dorso & alis canis, remigum extremitates albæ.

Magnitudine *fuscum* superat. Rostrum flavum angulo croceo. Ex *Islandia*.

An *Martensi* Burgemeister, *spitzb.* p. 60. t. L. c. non obstat, quod eum ut tridactylum descripsit, id enim etiam de Catharacta Parasitica falso affirmat.

149. ARGENTATUS, albus dorso alisque canis, remigibus primoribus versus apicem nigris.

Briffon.

Briffon. CII. 10. t. 16. f. 2. Larus Gavia cinerea major.

Descr. Albus capite colloque lineis cinereis maculatis; dorsum & alæ canæ; remiges primores a basi ad medium canescentes, reliqua medietate nigra, extremitate alba; rostro flavo, angulo croceo. Magnitudine *L. fusci*. E *Christiansøe*.

150. VARIUS, ex albo fuscoque maculatus; remigibus primoribus nigris; cauda ex albo nigroque maculata.

Briffon. orn. CII. 5. t. 15. Larus varius f. Skua. Danis Graae-Maage, Islandis Rablabrinkar.

Descr. Magnitudine *L. fusci*, ex albo fuscoque varie maculatus; remiges primores nigræ, apicibus albis, exceptis anticis tribus apicibus vix pallidioribus; cauda ex albo nigroque maculata, maculis majoribus nigris; rectrices omnes marginibus & apice albæ. Ex *Islandia* & *Christiansøe*.

Sterna.

151. HIRUNDO, fronte alba, *Fn.* 158. Islandis Kria, Norvegis Tenne, Tende, Tendeløber, Sand Tolle, Sand-Tærne, Danis Tærne, Bornholmis Kirre, Krop-Kirre.

Ex

Ex *Islandia, Christiansøe & Siælandia*, habitat quoque in *Norvegia*.

152. PARADISÆA, rectrice extima ala complicata multo longiore, fronte cum reliqua parte capitis nigra.

Bornholmis Hætting, Tærne. An varietas præcedentis, sexu v. ætate diversa. E *Christiansøe*.

153. NIGRA, *Fn.* 159. Siælandis Glitter. E *Siælandia*.

Platelea.

LEUCORODIA, *Fn.* 160. Danis Skuffel. Ad insulas Feroenses frequens, unde *Wormius* integram sibi afferri curavit. *Worm. mus. pag.* 310.

Ardea.

154. CICONIA, *Fn.* 162. Danis Stork, habitat in *Siælandia & Cimbria*.

NIGRA, *Fn.* 163. rarior est, in *Siælandia* tamen visa.

155. STELLARIS, *Fn.* 164. Danis Nørdrum. E *Siælandia*.

Rostro in alis occulto bubit, quod sæpius observavit quidam Hafniæ civis, *stellarem* per longum tempus domi alens.

156. CINEREA, *Fn.* 165. Siælandis Norvegisque
Hære v. Hære, Cimbris Skid-Hære, Skreda
Hære, Norvegis etiam Renger. E *Siælan-*
dia & Norvegia.

GRUS, *Fn.* 161. Danis Trane. Habitat in *Cimbria &*
Lollandia.

Scolopax.

157. TOTANUS, *Fn.* 167. Danis Rødbeene. Norve-
gis Lare-Lite, Lare-Litring. E *Siælan-*
dia & Norvegia.

158. ARQUATA, *Fn.* 168. Danis Heel-Spove, Regn-
Spaer, Regn-Spove. Magnitudine gallinæ.
E *Norvegia & Islandia.*

159.

Scolopaces & Tringa communi nomine Danis Sneppe, Nor-
vegis quibusdam & Islandis Snipa dicuntur. Quæ la-
cus frequentant, Myr-Snepper audiunt; aliæ Skov-
Snepper in sylvis degentes; aliæ Strand-Snepper in
littoribus obviæ. Venatoribus nonnullæ Bekkafine ap-
pellantur, quarum tres numerantur differentiæ, sc.
maximæ treedobbelte Bekkafiner, mediæ, dobbelte Bekka-
finer; minimæ; enkelte Bekkafiner. Nomini huic pe-
grino, e gallico *beccaseau* orto, respondent Cimbro-
rum Tasle & Skrætte.

159. PHÆOPUS, *Fn.* 169. Danis Mellem-Spove. Norvegis etiam Smaae-Spue. Magnitudine columbæ. E *Cimbria*.

160. GALLINAGO, *Fn.* 173. Islandis Mnr-Snippe, Danis dobbelt Sneppe, Steen-Sneppe. Cimbris quibusdam Høffegjøg. Norvegis Trolde-Ruse. Ex *Islandia*, *Cimbria* & *Sielandia*.

161. - - - lineis frontis fuscis ternis, rectricibus lateralibus albis.

Descr. Præcedenti paulo minor, coloribus magis saturatis, linea verticali unica lata nigra, collum & dorsum testacea maculis sinuosis nigris, pectus, sternum & abdomen alba, maculis transversis fuscis sinuosis varia, abdominis medietate vix maculata; alæ nigræ maculis testaceis & candidis variegatæ, remigum prima a latere anteriore margine vix albicante; remiges primariæ nigræ immaculatæ, secundariæ e cinereo nigricantes apicibus albis, posticæ testacæ, tæniis nigris interruptæ; pennæ scapulares margine exteriori longitudinaliter testaceo. Rectrices 16. laterales 4. albæ, basi infima nigra; 5 & 6 ferrugineæ apicibus albis; intermediæ 4. maxima ex parte nigræ, ferrugineo interruptæ, ante apicem

cem macula magna ferruginea, angusta nigredine terminata, apice vix albido.

Hanc & proxime præcedentem §. 161, marem & fæminam esse observavit Dnus *de Teilmand*.

162. GALLINAGO, *varietas*, differt a descriptione *Fn. Sv.* tantum remige prima, quæ a latere anteriori huic non est alba, sed nigra cum reliquo pennæ. E *Christiansøe*.

163. MINIMA, Briffon. orn. LXXVII. 3. *tab. 26. f. 2.* Danis *Nor. Sneppe*. Magnitudine alaudæ; fascia verticali nigra unica, linea utrinque nigra a rostro per oculos ducta; hinc rænia capitis longitudinalis duplex fulva. E *Christiansøe*.

164. RUSTICOLA, *Fn. 170.* Norvegis *Blom-Rosse, Rutte*, quibusdam *Krog-Ovist*. E *Christiansøe*.

165. LAPPONICA, *Fn. 174.* Cimbris *Robberhøne*. E *Cimbriæ prædiis Lönborregaard & Endrupholm*.

166. - - - *varietas* pectore vix ferrugineo. E *Christiansøe*.

167. FALCINELLUS, rostro depresso apicibus decurvatis, corpore fusco lituris luteis; rectricibus cinereis apice albis, intermediis nigris immaculatis.

Pontopp. atl. dan. I. t. 26. fig. 4. Siælandis Ryle, Domsneppe.

Descr. Roſtro infra nares depreſſo, planiuſculo apicibus decurvatis, caput, collum, dorſumque fuſca lituris luteis, alæ cinereæ, remiges primores nigricantes, tectrices harum apicibus albis, ſecundariæ cinereæ, a latere exteriori verſus apicem ad rachin uſque inciſæ; poſticæ longiores margine ferrugineo; apicibus albis, intermediæ nigræ immaculatæ; tectrices caudæ ſuperiores ex albo nigroque variæ. E Siælandia.

Ob roſtrum, capite multo longius, eum inter ſcolopaces deſcripſi.

GLOTTIS, *Fn. 171. Norvegis Høſt, Fugl, Ström. ſöndm. I. p. 235.*

Tringa.

168. 169. PUGNAX, *mas & fæmina, Fn. 173. Danis Bruushane. Ex Islandia, Siælandia & Cimbr.*

Mas abjecta tempore autumnali juba pennacea, *Staal Sneppe* audit, *Mörinellum* ſapore ſuperans.

170. VANELLUS, *Fn. 176. Danis Bibe, Rivit. E Cimbria, Chriſtiansøe & Islandia, habitat quoque in Norvegia.*

171. LOBATA, *Fn.* 179. Caput, collum, pectus & abdomen alba, vertex capitis niger, linea pone oculos exigua alba. Dorsum nigrum maculis ferrugineis quibusdam; remiges nigrae, interiores margine albo; rectrices apice albæ, hinc linea alaris alba. Reliqua conveniunt cum descriptione *Fnæ Svec.*

Pontopp. atl. dan. tab. 26. f. 2. E Christiansöe.

172. FULICARIA. *Linn. syst. nat.* LXXVIII. 6.

Descr. Magnitudo Sturni; Caput nigrum, linea alba utrinque ab oculis ad nucham ducta, colli pars supina & dorfi antica pars nigra, lineis quibusdam luteis variegata; postica pars dorfi & uropygium cinerea; subtus tota inde a rostro usque ad extremum caudæ ferruginea. Alæ forcipatæ, remiges primariæ & secundariarum plurimæ margine interiori albo, nonnullis corpori vicinioribus albis totis, posticæ primoribus longitudine fere æquales, nigrae; pennæ scapulares longiores, nigrae, marginibus luteis; rectrices alarum nigrae, at secundariis remigibus proxime superjacentes apice albæ, hinc lineæ alaris alba; Rectrices 5. 5. ex cinereo nigricantes, singulæ a latera exteriori versus api-

cem macula notantur ferruginea; duæ intermediae nigrae immaculatae. Rostrum latum, planum, supra bifurcatum, apice angusto acuto inflexo. Digiti 3 antici semipalmati, cohaerentes ad dimidium usque membrana natatoria, quæ, fissæ & lobata, cingit digitorum margines interiores & exteriores omnes; membrana ipsa omni margine fimbriata s. inciso-denta. Digitus posticus membrana quoque simili a latere interiori instructus. E *Grönlandia*.

173. ALPINA, *Fn.* 181. Rectrices duæ intermediae magis fuscescentes & paulo longiores, collum & pectus alba, nigro maculata. E *Christiansøe*. An *Brissonii* Tringa Cinclus torquatus LXXV. II. tab. 19. f. 2.

174. HYPOLEUCOS, *Fn.* 182. Norvegis den lille Myrstiffel, Bornholmis Birlen. E *Christiansøe*.

175. INTERPRES, *Fn.* 178. Bornholmis Beidetitten. E *Christiansøe*.

176. SQUATAROLA, *Fn.* 186. Bornholmis Flytes-Enten, Dollen. E *Christiansøe*.

177. LITTOREA, *Fn.* 185. Bornholmis Strand-Bekstasin. E *Christiansøe* & *Cimbria*.

178. LITTOREA, *varietas*, præcedenti simillima, excepta remige prima, quæ rachi, non nivea, sed nigra gaudet; maculæ quoque in hujus dorso alisque sunt minores. Turture minor. E *Christiansöe*.

An sexu vel ætate a præcedenti diversa?

179. CINEREA, dorso alisque cinereis, lituris nigris albisque undulatis, rectricibus cinereis marginibus albis.

Descr. Magnitudo sturni. Cinera sunt dorsum & alæ, lituris nigris; abdomen album; remiges primariæ fuscæ apicibus vix albicantibus, secundariæ cinereæ marginibus undique albis. Rectrices 12. cinereæ marginibus undique albis; rectrices caudæ superiores albæ nigro fasciatae. Rostris apex paulo crassior. Cum *Tringa hypoleuc.* in multis convenit. E *Christiansöe*.

180. FERRUGINEA, subtus tota ferruginea; dorso e nigro, ferrugineo alboque vario, rectricibus intermediis apice subcaudato.

Islandis Randbrislíngar.

Descr. Magnitudo præcedentis. Dorsum e nigro, ferrugineo alboque varium, latera capitis & tota avis subtus ferruginea; vertex capitis nigrans;

alæ cinereæ, remiges fuscæ, 4 primores immaculatae, reliquæ margine exteriori albo. Uropygium cinereum, fusco, albo luteoque maculatum, rectrices cinereæ immaculatae, exceptis 4 intermediis; intermediae duæ apice subcaudato s. angusta extremitate auctæ. Rostrum subarcuatum. Ex *Islandia & Christiansöe*.

181. VARIEGATA, supra fusca, luteo maculata; subtus cinerascens, abdomine albo, rectricibus, nigricantibus, apice lituraque luteis.

Descr. Magnitudo *squatavole*, supra fusca marginibus pennarum ex albo luteis, uropygio cinereo; Remiges primores e fusco viridescentes, rachis prima nivea; secundariae cinereæ margine exteriori albo; remiges posticæ alæ complicatae primoribus longitudine æquales & concolores, marginibus & litura angulata luteis; collum & pectus e luteo cinerea, abdomen album; rectrices nigricantes apice lituraque luteis. E *Christiansöe*.

182. MARITIMA, fusca cinereo undata, rectricibus lateralibus 4 utrinque brevioribus; basi rostri pedibusque flavis.

Ström.

Ström. söndm. I. p. 225. Norvegis *Fierer*, *Dist*, *Fierer*, *Kuro*, *Fierer*, *Muus*, quia in *Fiereren* : littore maris degit, semper sibilans; hinc etiam *Strand*, *Erle*, dicitur. Islandis *Sidlingar*, *Kall*. Bornholmis *Rytteren*.

Descr. Magnitudo sturni. Corpore supra fusco cinereo undato, collum antice fuscum, pectus & abdomen alba. Remiges nigricantes, rachi primæ nivea, secundariarum anteriores apicibus albis, posteriores albæ fascia nigra; posticæ nigricantes. Rectrices nigrae, laterales utrinque 4. reliquis paulo breviores, cinereæ margine albo; intermediæ fusca. Rostrum nigrum, basis rostri pedesque flavi. E *Christiansøe & Norvegia*.

183. UNDATA, fusca, ex albo luteoque undulata; uropygio albo; rectricibus cinereis marginibus apicum nigris, remigum prima rachi alba; remigibus secundariis earumque rectricibus apice albis.

Color rostri plerumque in exsiccatis exuviis deletus, semper erat dubius, hinc eum in descriptionibus omittere coactus sum.

OCROPHUS, Fz. 180. Danis *Horsfæg*. Islandis *Hrossa*, *gauf*. Norvegis *Skodde*, *Foll*, *Skodde*, *Fugl*, *Ford*, *Geed*, *Mæftr*, *Gouf*, *Ros*, *Gouf*. Hujus varietas

vel nova species describitur *Ström. Söndm. I. p. 252.*
 „ Caput & collum grisea, albo punctata; dorsum fu-
 „ scum, maculis saturatioribus & albis varium; posti-
 „ ca pars dorsi, uropygium, pectus & abdomen alba,
 „ maculis in pectore nigris. Remiges nigrae, rachi
 „ primæ niveae; Rectrices albæ, griseo undulatae. Ro-
 „ strum nigrum, pedes virescentes. In *Norvegia &*
Islandia.

Charadrius.

184. HIATICULA, *Fn. 187.* Bornholmis Præsteskra-
 ve, Sand, Brister. E *Christiansøe & Cim-*
bria; habitat quoque in *Norvegia.*

Charadrium e *Christiansøe* sub nomine *Gittsmule* ante
 hos tres annos accepimus, quam ex descriptione tunc
 data puto fuisse varietatem hujus speciei. Dermesti-
 dum voracitate post aliquod tempus debebatur exem-
 plar, antequam sub ulteriori revocabatur examine;
 nec postea aliud videre nobis contigit.

185. MORINELLUS, *Fn. 188.* Cimbris Pommerantz
 Jugl, Norvegis Bold, Liæt, den mindre Åfers
 lœ. E *Cimbria & Norvegia.*

186. APRICARIUS, *Fn. 189.* Norvegis Højloë, My-
 reløe; Cimbris Højle. E *Norvegia, Cimbria*
& Islandia.

187. PLUVIALIS, *Fn.* 190. Norvegis *Åkerlœ*; Cimbris *Brof; Jugl.* E *Norvegia, Islandia & Cimbria.*

Avem e familia Grallarum sub nomine *Quisse-Field* affert *Ström. fönadm.* 248. Eam ex aliorum relationibus dicit, staturæ esse columbæ vel sternæ, e griseo variegatam, lineis flavis albisque in capite pictam, ceterum *Hæmatopo ostralego* similem, rostro longo & obtuso, pedibus longis rubris, femoribus seminudis, digitis fissis. Æstivo tempore degit *Ostralegi* instar in littore. Nomen ex alacritate fortita est, semper enim curstat, continuo vociferans. Confert Rev. Autor hanc avem cum *Kleinii* *Gavia brachyptera* vocifera, hist. av. p. 21. quæ est *Linnei* CHARADRIUS VOCIFERUS.

Recurvirostra.

188. Avoletta, *Fn.* 191. Danis *Rhyde, Iousugl, Forkeert; Regnslove.* E *Sialandia* habitat quoque in *Cimbria.*

Hæmatopus.

189. OSTRALEGUS, *Fn.* 192. Islandis *mas Tialldur*, fœmina *Tilldra*, Feroensibus *Kielder*, Norvegis *Field v. Kield*, *Glib, Strand; Skiure, Strand; Skade.* E *Sialandia, Christiansœ*

& *Islandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

Fulica.

190. ATRA, *Fn.* 193. Danis Vand: Høne, Bles: Høne. E *Norvegia* & *Cimbria*.

191. CHLOROPUS, *syst. nat.* 82. 2. E *Fredensborg Sielandia*. Avis inter minus obvias numeranda.

Rallus.

192. CREX, *Fn.* 194. Danis & Norvegis Bagtel: Rønge, Aker: Rire, Skov: Snarre. Quibusdam *Norvegiæ* incolis Agerhøne. E *Christiansøe*, *Norvegia* & *Cimbria*.

193. AQUATICUS, *Fn.* 195. Norvegis Vand: Rire, Feroensibus Jord: Røene. E *Feroa* & *Cimbria*; habitat quoque in *Norvegia*.

Domesticas aves, Pavonem cristatum Paasugl, Meleagridem gallopavonem Rallonsf Høns, Phasianum gallum ejusque varietates, omnibus notas, heic tantum nominare sufficit.

Speciem phasiani, ut puto *colchicum*, in prædio Jægerspruis *Sielandia*, & insula *Taaſinge* prope *Fioniam* spontaneam habitare affirmant autoptæ.

Tetrao.

Tetrao.

194. 195. UROGALLUS *mas & femina. Fn. 200.*
mas Norvegis Tiur, Teer, Tødder. Fæmina
iisdem Rey. Danis Norff: Kalkon v. Feders
Hane. E Norvegia.
196. 197. TETRIX *mas & femina, Fn. 202.* Nor-
 vegis Uarsugl rectius Orrsugl; Cimbris Urhøns.
E Norvegia & Cimbria.
198. LAGOPUS, albus, exceptis rectricibus nigris.
Hyeme occifus.
199. - - - ex albo fusco & testaceo varius. Æsta-
te occifus.
Fn. 203. Norvegis Rype. Qui in alpibus ha-
bitat, Fjeld: Rype, Fjeld = Skarv dicitur, minor;
Qui in fylvis degit, Skov, vel Tie: Rype audit,
major. Mas Islandis Riupflarre, fæmina Riupa.
E Norvegia, habitat quoque in Islandia.
200. BONASIA, *Fn. 204.* Norvegis Sierpe v. Serpe.
Habitat in Diœcesibus Christianiensi & Nidrosiensi
Norvegiae.
201. PERDIX, *Fn. 205.* Ugerhøne. *E Cimbria &*
Sialandia. Norvegis ignota avis.
202. COTURNIX, *Fn. 206.* Danis Bagtel. *E Cimbria.*
 Colum-

Columba.

203. Oenas, *Fn.* 207. Danis Kirke Due, Skov Due, E Sielandia, Cimbr. & Christiansøe, habitat quoque in Norvegia.

204. PALUMBUS, *Fn.* 208. Danis Ringel Due. Bornholmis Skude. E Sielandia, Cimbr. & Christiansøe.

Columbarum species & varietates domesticæ, quarum nonnullæ in museo servantur, aliæ in domibus obviæ, autoribus minus notæ sunt, ideoque heic eas cum ejusmodi characteribus nominibusque danicis, quibus a peritis distinguuntur, recensabo.

205. VERTAGA iride lucida albida, pupilla atra, in volatu retrorsum volubilis. *Tumiter.*

1. Atra alis totis & abdomine albis: *Skade.*
2. Atra, alis ad dimidium & abdomine albis: *Rnosfel, Skade.*
3. Alba, pileo & rectricibus nigris; mandibula superior nigra, inferior alba. *Kalotte.*
4. Nigra remigibus septem primoribus albis.
5. Nigra remigibus septem primoribus rectricibusque omnibus albis.
6. Atra rectricibus albis. *Hybrida.*
7. Cœrulea. 8. Atra. 9. Alba. } *Unicolores.*
10. Rufa. 11. Flava.
12. Gutturæ alarumque fasciis flavis vel rufis.
13. Cauda patule; corpore plerumque toto albo. *Huulrumped.*
- 14.

14. Atrā, variis coloribus intertextis. } Greyser.
15. Alba, variis coloribus intertextis. }

206. FULICARIA, corpore albo, fronte maculata; cauda fronti concolore. Snippert.

1. Macula frontali & rectricibus rufis, mandibula superiore alba.
2. Macula frontali & rectricibus atris, mandibula superiori atra.

207. MELANURA, corpore niveo; capite, rostro, cauda & 7 remigibus primoribus atris; pennis occipitis in galeam erectis, antice nigris pone albis. Monneke.

208. MELANOCEPHALA, corpore niveo, capite toto, rostro & cauda atris; galea in capite antice nigra, pone alba. Morenfop.

209. TREMULA, cauda erecta multipenni patula rectricibus 36. Hen: Stierr.

1. Nivea. 2.) Variegata.

210. GALEATA colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus; capite, oculis, remigibus primoribus & rectricibus albis, pennis occipitis in galeam erectis. Krossonobel.

211. CUCULLATA, colore vario, fasciis alarum corpori concoloribus, capite, oculis, remigibus primoribus

moribus & rectricibus albis, pennis occipitis in cucullum reflexo-erectis. *Paryf: Due.*

212. GUTTUROSA, gutture inflato, *Krop: Due.*

a) Major Heelfkropper, b) Minor Halvkropper.

1. Alba, rectricibus nigris.

2. Nigra, remigibus primoribus albis.

3. Rufa, remigibus primoribus albis.

4. Flava, remigibus primoribus albis.

213. TABELLARIA, rostro longiore, cera lata verrucosa ad dimidium recto, palpebris nudis. *Pavedette.*

214. TYMPANISTA, pennis in basi rostri recurvatis, *Trommel: Due.*

1. Tigrina. 2. Ex albo nigroque varia.

215. MERCURIALIS, corpore niveo, pileo capitis, pedibus pennatis alisque unicoloribus: *Svalle: Due.*

1. Glaucis. 2. Nigris. 3. Rufis vel 4. Flavis.

216. TURBITA pennis in pectore recurvatis; rostro minuto. *Mæfesse.*

Alis 1. Flavis. 2. Rufis. 3. Atris. 4. Glaucis.

5. Argenteis. 6. Albis. 7. Albis, rectricibus

nigris. 8. Fasciatis a) *Fascia atra.* b) *Fascia*

cærulea. c) *Fascia spadicea.*

217. TURCA oculis magnis lucidis, palpebris nudis rubris, rostro minuto. *Tyrk.*

1. Atra

1. Atræ. 2. Albæ. 3. Flavæ. 4. Rufæ. Variant capite cristato & simplici.

218. PERCUSSOR, versicolor variæ & indeterminate volans. Dreper.

219. PROLIFERA, unico vel variis coloribus irregulariter picta. Maanedts v. Gaard. Due.

1. Variiegata. 2. Unicolor: a) cœrulea, b) nigra, c) alba.

Inter proliferas numeratur quoque *columba oenas domestica*, feræ coloribus similis. Ceteræ varietates omnes hybridæ, e præcedentibus ortæ.

220. RISORIA, *syst. nat.* 92. 21. Danis Turteldue, In caveis alitur.

Alauda.

221. ARVENSIS, *Fn.* 209. Danis Sangsørke. E *Sielandia* & *Christiansøe*, habitat quoque in *Norvegia*.

222. - - - varietas cinerea; candidam autem possidet Excell. Dnus *Otto de Thott*, nuperrime in prædio ejus *Gavnøe* occisam. Aliâ propre *Farrum Sielandiæ* visa fuit. Candidam delineavit *Frisch.* av. t. 16. qui, eas e septentrionalibus regionibus venire, existimat; *Klein*.

223. PRATENSIS, *Fn.* 210. Danis Englerke. E *Siælandia* & *Christiansøe*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

224. 225. ARBOREA, *mas* & *fæmina*, *Fn.* 211. *Brisson. orn.* XXXIX. 2. t. 20. f. 1. Danis Skovlerke; Cimbris Heede-Lerke; Iyng-Lerke. Tænia supra oculos candida; rectrice extima exterius & apice alba. *Fæmina* a mare differt maculis fuscis in pectore rarioribus & remigum majorum oris exterioribus griseis, dum in mare sunt olivaceæ. E *Christiansøe* & *Cimbria*.

226. CAMPESTRIS, *Fn.* 212. Danis Mark-Lerke. E *Siælandia* & *Christiansøe*.

227. TRIVIALIS, *syst. nat.* 93. 5. Danis Hauge-, Hylde-, Pibe-, Lerke. E *Christiansøe*.

228. CRISTATA, *syst. nat.* 93. 6. Danis Top-, Beyer-Lerke. E *Siælandia*.

Sturnus.

229. VULGARIS, *Fn.* 213. Danis & Norvegis Stær, Frequens in *Dania*, *Norvegia* & *Islandia*.

230. CINCLUS, *Fn.* 214. Norvegis Fosse-Kald, Fosse-Kald, Dværn-Kald, Strøm-Stær, Bække-

Bælle: Fugl, Elbe: Ronge. Cimbris male
 Isfugl. E *Christiansøe* & Norvegia; in *Cim-*
bria quoque, sed hieme tantum, ad aquas, gelu
 non constringendas, conspicitur.

Turdus.

231. VISCIVORUS, *Fn.* 216. Danis dobbelt Kramsfugl.
 Rectrices hujus apicibus gaudent acumi-
 natis. E *Christiansøe*.

232. PILARIS, *Fn.* 215. Danis dobbelt Kramsfugl,
 Cimbris, Snarrer, Norvegis Graae: Trost,
 Field: Trost, Norden: Binds Pibe, Born-
 holmis Simmeren. Capite & uropygio
 cinereis, capite per series nigro maculato,
 dorso e fusco rufescente; remigibus primariis
 rectricibusque nigris; prona pars a rostro ad
 ventrem rufescens, maculis nigris aspersa. E
Christiansøe, ceterum ubique obvius.

233. - - - capite, dorso & uropygio cinereis,
 gutture albo; remigibus & rectricibus e cinereo
 fuscis; reliqua ut in præcedenti, sed coloribus
 magis dilutioribus. E *Christiansøe*.

Voces *ca ca* inter cantandum frequenter repetit.

E

234.

Turdorum genus Danis Drossel v. Kramsfugl, Norvegis
 Trast v. Trost audit.

234. 235. MERULA, *Fn.* 220. Danis & Norvegis
Sælsort, Solsort. Rostrum maris flavum vel
croceum, fœminæ dilutius. E *Christiansøe*,
habitat in *Cimbria & Norvegia*.

236. MUSICUS, *Fn.* 217. Cimbris & Bornholmis
Wiindrossel. Norvegis Fjeld-Trast; Tale v.
Maal-Trast. E *Christiansøe*, habitat in *Cim-
bria & Norvegia*.

237. TORQUATUS, *Fn.* 221. Danis Ring-Drossel;
Norvegis Ring-Trast. E *Christiansøe*; ha-
bitat in *Cimbria & Norvegia*.

Loxia.

238. CURVIROSTRA, *Fn.* 224. Norvegis Kors-Næb,
Kors-Fugl. E *Norvegia*.

In exemplari, quod descripsimus, mandibula supe-
rior in dextrum latus descendit, inferior in sinistrum
assurgit; contra vero in aliis observarunt multi, &
cum iis *Brissonus*.

Caveis inclusæ rostri apices, quæ ad enormem cre-
scunt longitudinem, subinde amittunt, id quod in
eo, quod descripsimus exemplari, est observatum;
apices quoque decidui satis magni in museo servan-
tur.

239. ENUCLEATOR, *Fn.* 223. Norvegis Kirsebær-
Fugl, Norsk Papegone, den gulshædede
Dom-Dre. E *Norvegia*.

240. 241. PYRRHULA *mas & femina*, *Fn.* 225. Da-
nis & Norvegis Dom-Pape. Norvegis qui-
busdam Dom-Herre. E *Christiansøe & Sæl-
landia*, habitat quoque in *Norvegia*.
Dantur varietates, una major, altera minor.

242. 243. CHLORIS *mas & femina*, *Fn.* 226. Danis
Svenske. E *Christiansøe & Sællandia*.

244. ATRA, corpore toto atro; macula alari alba.
Descr. Magnitudo passeris domestici. Tota
atra, uropygio ex atro cærulescente. Remi-
ges primores 4 albæ, versus apicem nigræ, hinc
macula linearis alarum alba. Rectrices omnes,
excepta laterali tota nigra, basi albæ. E *Chri-
stiansøe*.

Magnitudine & colore convenit cum *Loxia nigra*
Catesb. car. I. p. 39. t. 39. *Linn. syst.* I. 96. 28.
excepta macula humerali alba, qua nostra caret.

Emberiza.

245. 246. NIVALIS *mas & femina*, *Fn.* 227. Nor-
vegis Sneefugl, Fiælsler. Cimbris Sneekof,

Winterfugl. E *Christiansøe* & *Norvegia*, habitat quoque in *Cimbria*.

247. 248. *CALANDRA mas & femina*, *Fn.* 228. *Brissou. orn.* XXXV. 10. *Cimbris Korn-tærke*, *Norvegis Knøtter*. E *Christiansøe*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

249. 250. *CITRINELLA mas & femina*, *Fn.* 230. *Brissou. orn.* XXXV. 1. *Danis den store Gul-spurv*, *Bornholmis Gulverting*. E *Christiansøe*, habitat in *Dania* & *Norvegia*.

251. 252. *SCHOENICLOS mas & femina*, *Fn.* 231. *Brissou. orn.* XXXV. 5. *Danis Høt-Spurv*. E *Sialandia* & *Christiansøe*.

HORTULANUS, *Fn.* 229. *Danis Hortulan*, *Thurah. bornholm. pag.* Habitat in *Bornholmia*.

Fringilla.

253. 254. *COELEBS mas & femina*, *Fn.* 232. *Danis Vosinke*, *Vogsinke*. Ubique per *Daniam* & *Norvegiam* frequens.

255. 256. *MONTIFRINGILLA mas & femina*, *Fn.* 233. *Danis Dvæker*, *Vosinkens Hore-Unge*; *Usterlan*? E *Sialandia* & *Christiansøe*.

257. 258. *CARDUELIS mas & fœmina, Fn. 236.*
Danis Stiglig. Ubique frequens.
259. 260. *CANARIA mas & fœmina, Syst. nat. 1.*
98. 18. Danis Kanarie: Sugl. In caveis ubique alitur.
261. 262. *SPINUS mas & fœmina, Fn. 237. fœmina.*
Briffon. orn. XXXII. 4. mas & fœmina. Danis
Sisgen. E Christiansœ & Sielandia.
263. *CANNABINA mas, Fn. 240. Danis Torn: Triff;*
Sidse Ronnife? E Sielandia.
264. 265. *DOMESTICA mas & fœmina, Fn. 242.*
Graae: Spurre, Norvegis Huus: Rald.
266. - - - *varietas, tota nigra.*
Passeres albos in Sielandia captos fuisse refertur. O.
Jacob. mas. P. 2. 82.
267. *MONTANA, Fn. 243. Danis Skov: Spurre.*
Ubique frequens.
268. - - - *Varietas, capite cinereo, fascia sp-*
dicea supra oculos ad latera colli deducta, & in
parte colli superiori coeunte: gutturis color ni-
ger continuatur in collo & pectore superiore.
Rostrum huic est flavum. E Sielandia.

LINARIA, *Fn.* 241. Danis Graafsiggen, Moiriff. in *Sia-*
landia.

Motacilla.

269. MODULARIS, *Fn.* 245. Danis Graae-Triff. E
*Sia*landia, habitat quoque in *Cimbria.*

270. PHILOMELA, *Syst. nat.* 99. 10. Danis Mattered
galens Hore-Unge. E *Sia*landia.

271 ALBA, *Fn.* 252. Danis Bispstiert, Havresæer,
Havre-Fugl, Steenpikker; Norvegis Erle,
Lin-Erle. Feroensibus Elle-Kongens Datter.
E *Sia*landia, *Cimbria*, *Norvegia* & *Feroa.*

272 - - - *Varietas*; a præcedente differt capiti
dorso concolore, collo inferiore albo, macula
nigra ferri equini æmula, cujus concavitas caput
spectat, duobus scilicet brachiis secundum colli
latera ascendentibus. Confer. *Brissson. orn.* XL.
38. An differentia ætatis v. sexus. E *Sia-*
landia.

273. 274. FLAVA *mas* & *femina*, *Fn.* 215. Fœmi-
na multo minus est lutea quam *mas*, vix enim
flavedine tingitur. Danis Gulspink. E *Sia*lan-
dia & *Cimbria.*

275. SYLVIA, *Fn.* 250. Remigum secundariorum margines exteriores in nostro exemplari ferruginei. E *Siælandia*.

276. OENANTHE, *Fn.* 254. Norvegis Steendolp, Steensqvette, Steengylpe. E *Christiansøe* & *Siælandia*, habitat quoque in *Norvegia*.

277. RUBETRA, *Fn.* 255. Rectrices duæ, intermediis proximæ, a latere exteriore toto nigræ, interiore dimidiato albæ & nigræ. E *Christiansøe*.

278. ATRICAPILLA *mas*, *Fn.* 256. Danis Hav-Skade. quibusdam Spiffe. E *Siælandia* & *Christiansøe*.

279. - - - *fæmina*, *Fn.* 256. incolis *Christiansøe* Brun-Skalle. E *Christiansøe* & *Siælandia*.

280. 281. PHOENICURUS *mas* & *fæmina*, *Fn.* 257. Norvegis, Blod-Fugl, Rød-Stiert.

An eadem cum *motacilla Titys*, quæ in altera editione *Fn.* Sv. omiſſa eſt.

Mas differt a *fæmina* ſyncipite candido, genis, gutture & collo inferiore nigris. E *Christiansøe*, habitat in *Norvegia*.

282. FICEDULA, *Fn.* 251. Danis Spids:terke. E *Sielandia*.
283. RUBECULA, *Fn.* 260. Danis Rød:Finke, Rød:Kielke. Cimbris quibusdam Rotgel. E *Sielandia*, *Cimbria* & *Christiansøe*.
284. TROGLODYTES, *Fn.* 261. Danis Nelles-Konge, Gierd:Smutte, Bornholmis Tommeliden, Norvegis Peter Monsmad, Cimbris Thomas i Gierdet. Feroensibus Musebroder. Ubique in *Dania*, *Norvegia* & *Feroa* frequens.
Intrat casas Feroensium, carnem exsiccandam incolarum consumens.
285. REGULUS *mas* & *fœmina*, *Fn.* 261. Mas differt a fœmina superne colore non nihil ad flavum inclinante, qui in fœmina est olivaceus; vertice quoque aurantio, qui in fœmina est luteus. Danis Fugle:Konge. E *Sielandia* & *Cimbria*.
286. TROCHILUS, *Fn.* 264. Danis Spurre:Konge, Fager:Fiis. E *Sielandia*.
- CURRUCA *Fn.* 247. & HIPPOLAIS *Fn.* 248, sub nomine Græs-smutte in *Sielandia* notæ sunt.

Parus.

287. MAJOR, *Fn.* 265. Danis Musvit. E *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

288. COERULEUS, *Fn.* 267. Danis Blaaemeise. E *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

PALUSTRIS, *Fn.* 269. Norvegis Graae-Meise. *Ström. söndm.* I. 239.

IGNOTUS, *Ström. söndm.* I. 240. ubi ita describitur:
„Rostrum supra nigrum subtus flavum; guttur flavum, collum & corporis pars supina e flavo viridis; pectus flavum spadiceo maculatum. Abdomen cæruleum, prope anum flavescens, Cauda bifurcata dorso concolor, rectricibus intermediis duabus viridescentibus, duabus extimis albo marginatis. Pedes nigri, unguis posticus reliquis triplo longior. An Varietas Pari majoris cui simillimus, excepto capite nequaquam nigro. In *Norvegia*.

Hirundo.

289. RUSTICA, *Fn.* 270. Danis Forstue-Svale, Mark-Svale. E *Christiansøe* & *Siælandia*, habitat quoque in *Cimbria* & *Norvegia*.

F

290.

Genus Pari communi nomine Danis Meise, Ried-Meise, Norvegis Talg-Oxe, Tite dicitur.

290. URBICA, *Fn.* 271. Danis Byer v. Tagsskiæg-
 Svale; quibusdam hviid Svale. Langelan-
 dis Rive. E *Sialandia* & *Christiansøe*, ha-
 bitat quoque in *Cimbria*, *Norvegia* & *Lange-*
landia.

291. RIPARIA, *Fn.* 273. Danis Dig v. Jord-Svale,
 Solbakke; Norvegis Sand-Renne. E *Sia-*
landia, habitat quoque in *Cimbria* & *Nor-*
vegia.

292. APUS, *Fn.* 272. Danis Steens, Kirkes, v. Soes
 Svale. E *Christiansøe* & *Sialandia*, habi-
 tat quoque in *Cimbria*.

Caprimulgus.

293. EUROPEUS, *Fn.* 274. Danis Nat-Ravn,
 Nat-Skade, Aftenbakke. E *Christiansøe* &
Sialandia, habitat quoque in *Cimbria* &
Norvegia.

Dubia.

Dubia.

Ulterius examinanda est avis anomalopes tetradactyla, tribus anticis, pede sinistro palmato, dextro fisso; rostro adunco apicibus, figuram harpes referente, mandibula inferiori truncata; capite & collo ex albo & cinereo variegatis, alis caudaque nigris abdomine niveo; incolis insulæ Christiansøe sæviori hieme interdum visa, illisque sub nomine Bærgen nota, quæ ita describitur a Dno. *Petersen*, qui avem hanc anno 1747. ibidem se conspexisse affirmat. Similem in mari Indico se observasse avem testatur *Bellegarde hist. Univ. des Voyages Vol. I pag. 346. sq.* ubi ita de hac ave loquitur:

„ On voit sur les mers, & sur les côtes des Indes, un
„ oiseau d'une espece tout-a-fait singuliere; il a les plu-
„ mes mouchetées comme un leopard; c'est un oiseau
„ de proye, & il exerce ses rapines sur mer, & sur
„ terre; pour cela l'un de ses pieds est large comme la
„ patte d'une oye, l'autre ressemble à la griffe d'un aigle.
„ Quand les poissons approchent de la surface de l'eau,
„ cet oiseau qui les apperçoit de loin, vient fondre sur
„ eux à tire d'aile, du milieu des airs, & les enleve
„ avec sa griffe, où il se repose sur la superficie de l'eau,
„ & nâge avec sa patte d'oye; quand il a attrapé quel-
„ que bon poisson, il va le manger à l'aise sur le haut
„ de quelque écüeil, ou sur un arbre: car comme je l'ai
„ dit d'abord, cet oiseau est terrestre, & aquatique tout
„ ensemble; il fait la chasse aux petits oiseaux, & aux
„ lezards, dont il se nourrit quand le poisson lui manque. „

TYPIS *ANDREÆ HARTVIGII*
GODICHE.

Appendix.

GENTILIS, *Fn.* 58. Siælandis Høuse-Høg.

- - b. Varietas pectore maculis transversis fasciarum instar undulato.

Hos, e prædio Endrupholm Cimbriæ missos, ejusdem fuisse speciei certo certius constat. Varietatem b. per annum captam tenebat Dnus de Teilmand, qui observavit in ea maculas pectoris antea oblongas post defluvium pennarum multiplicatas latioresque factas (atramenti instar in linteo vel charta bibula) hincque mutatas fere fuisse in fascias transversales. (*pag. 5. post §. 15.*)

ACUTA, *Fn.* 126. E prædio Lønborregaard Cimbriæ, sed minus frequens. (*pag. 21. post §. 91.*)

ALEXANDRINUS, Charadrius griseus, fronte, linea supra oculos, collari dorsali, abdomineque albis, reëtricibus lateralibus utrinque candidis, pedibus e fusco cærulescentibus. E prædio Endrupholm. *Linn. syst. nat.* I. LXXVII. 3.

Descr. Rostrum nigrum rectum, apicem versus gibbum, caput dorsumque grisea, frons ad basin rostri albida, inde linea utrinque supra oculos ducta alba; annulus colli latitudine $\frac{1}{2}$ pollicis una cum gula & gutture albus, Dorsi co-

lor griseus in infimam colli partem extenditur & in pronam ambit, antice vix coadunatus. Pectus, abdomen, cauda subtus & rectrices femorum alba. Alæ forcipatæ, remiges 26 e griseo nigricantes, intus albidæ, duæ extimæ æquales, primorum reliquæ successive breviores, intimæ 3 alæ complicatæ longitudine fere duarum extimarum sed dorso unicolores; rachis primæ remigis tota alba, in reliquis ad dimidium nigra. Remiges 5 - 8. macula alba oblonga in margine exteriori notatæ, secundariæ apice albæ. Rectrices remigum nigricantes apice albæ, rectrices reliquæ dorso unicolores. Alæ subtus albæ Rectrices XII, harum intermediæ 4. reliquis paulo longiores e fusco nigricantes; 1. 2. utrinque candidæ 3. 4. utrinque sordide albæ apicibus fuscis. Pedes avis adhuc vivæ e fusco cœrulei, digiti & ungues nigri; digitus tertius intermedio membrana annexus. Magnitudo media inter alaudam & sturnum.

Idem est cum Charadrio alexandrino *Hasselquist. Itin.* 255. 30. in multis autem differt ab Ægyptio *Ibid.* n. 31. ideoque minus accurate a Brissonio hi duo tanquam synonyma citantur *Brisson. ornitholog.* LXIX. 7. (*pag. 57. post §. 187.*)

CURVIROSTRA mandibula superiore in finistrum latus
descendente, inferiore in finistrum assurgente.

E Christiansöe. (*pag. 66. post-f. 238.*)

LUSCINIA, *Fn. 244.* Danis Hattergal. In Siælandia
haud infrequens. (*pag. 72. post. lin. ult.*)

Emendanda.

Pag. Lin.

1. - 16. **GENTILIS**, *Fn. 58.* lege **PALUMBARIUS**,
Fn. 67.
3. - 5. gentilis, - - palumbarius.
15. - 15. varietates, - - varietatibus.
18. - 18. **CIRCIA**, *Fn. 130.* - **CRECCA femina**.
25. - 6. **Uvarsus**, - - **Usparsus**.
52. - 10. Grönlanlandia, - - Grönlandia.
58. - 6. Fredensborg, - prædio Cathrineberg
Siælandiæ.

Addenda.

Pag. Lin.

3. - 2. **Blaaesalk**.
9. - 14. Ubique frequens.
11. - 10. Norvegis **Kraakspiute**.
12. - 4. E Christiansöe postea missa.
- - 15. Cimbris nonnullis **Grav-Drage**.

Pag.

Pag. Lin.

13. - 21. Cimbris quibusdam *Klinger: Gaas.*
 16. - 18. *Stiert: And.*
 - - 22. Etiam ex Endrupholm.
 21. - 16. E Siællandia postea accepta.
 25. - 7. Etiam e Cimbriæ prædio Endrupholm.
 - - 18. Grönlandis *Alpa.*
 37. - 10. *Post vocem Lönborregaard:* ubi longo
 quasi itinere defessa, inter boves, in cam-
 po pascentes, sese abscondens manibus
 capiebatur.
 46. - 17. & in prædio Gram Cimbriæ.
 49. - 13. & Endrupholm.
 52. - 13. & Siællandia ubi *Strand: Spurv* dicitur.
 - - 21. an Siælandorum *Pnten?*
 58. - 5. *Nor: Høne*, Cimbris quibusdam *Bondeløber.*
 - - 13. *Band: Bagtel.*
 63. - 13. Fera habitare fertur in prædio Gram.
 64. - 20. Albus in Siællandia captus est.
 65. - 5. Cimbris quibusdam *Domkraft.*
 74. - 2. *Skorsteen: Svale.*
 - - 6. *Klint: Svale.*
 - - 7. post vocem *Sand: Ronne* adde: *Digsfulu.*
 - - 10. *Muur: Svale.*
 - - 11. *Norvegis Svartsfulu.*

ET CUM

P. Brinnich ad nat. delin.

CATHARACTA CEPHUS.